年報（年間測定結果）

2023年度

測定項目：浮遊粒子状物質

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の割合	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の割合	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	1時間値の合計	環境基準達成状況	測定方法					
			(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m3)	(mg/m3)	(mg/m3)	(有×無○)	(日)	(mg/m3)	(達成○)						
一般	佐賀	住	363	8712	0.014	0	0.0	0	0.0	0.078	0.036	0.030	○	0	119.234	○	β線吸収法					
一般	神埼	未	364	8724	0.014	0	0.0	0	0.0	0.124	0.049	0.031	○	0	125.639	○	β線吸収法					
一般	三瀬	未	363	8708	0.012	0	0.0	0	0.0	0.086	0.037	0.029	○	0	107.228	○	β線吸収法					
一般	多久	住	363	8711	0.013	0	0.0	0	0.0	0.080	0.036	0.030	○	0	113.273	○	β線吸収法					
一般	鳥栖	住	364	8728	0.015	0	0.0	0	0.0	0.116	0.049	0.033	○	0	131.242	○	β線吸収法					
一般	基山	住	364	8729	0.014	0	0.0	0	0.0	0.088	0.041	0.032	○	0	125.007	○	β線吸収法					
一般	唐津	住	363	8701	0.013	0	0.0	0	0.0	0.089	0.044	0.034	○	0	116.166	○	β線吸収法					
一般	竹木場	未	364	8700	0.014	0	0.0	0	0.0	0.109	0.045	0.033	○	0	121.044	○	β線吸収法					
一般	大坪	住	362	8695	0.013	0	0.0	0	0.0	0.090	0.044	0.030	○	0	117.198	○	β線吸収法					
一般	山代	未	363	8703	0.014	0	0.0	0	0.0	0.094	0.042	0.032	○	0	118.160	○	β線吸収法					
一般	武雄	商	364	8725	0.014	0	0.0	0	0.0	0.082	0.040	0.031	○	0	123.328	○	β線吸収法					
一般	白石	未	363	8717	0.015	0	0.0	0	0.0	0.111	0.046	0.034	○	0	127.373	○	β線吸収法					
一般	鹿島	住	363	8722	0.014	0	0.0	0	0.0	0.086	0.039	0.029	○	0	119.416	○	β線吸収法					
一般	嬉野	住	364	8728	0.013	0	0.0	0	0.0	0.079	0.039	0.030	○	0	113.510	○	β線吸収法					
自排	兵庫	未	364	8732	0.014	0	0.0	0	0.0	0.113	0.048	0.030	○	0	124.303	○	β線吸収法					
自排	曽根崎	準工	364	8729	0.016	0	0.0	0	0.0	0.117	0.055	0.033	○	0	136.381	○	β線吸収法					
集計値			5815	139464	0.014	0	－	0	－	0.124	0.055	－	－	0	1938.502	－	－					