

海況情報（第2報） -令和6年5月8日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：10地点平均は19.0℃で、前回調査時（4月10日、以下同様）より3.6℃高く、
 平年と比べてやや高めとなっています。

比重：10地点平均は22.3で、前回調査より0.8高く、平年並みとなっています。

DIN(窒素)：10地点平均は1.5μg-at/L で、前回調査より3.3μg-at/L低く、
 平年並みとなっています。

DIP(リン)：10地点平均は0.4μg-at/Lで、前回調査時と同じ値で、
 平年並みとなっています。

プランクトン沈殿量：10地点平均は10.5mL/m³ で、前回調査より6.5mL/m³少なく、
 平年並みとなっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水温 (°C)	19.2	18.8	18.5	19.0	19.1	18.7	19.4	19.7	18.9	18.5	19.0	18.0
比重	22.4	22.6	22.7	22.2	21.4	22.6	21.9	22.0	22.4	23.0	22.3	21.2
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	0.8	1.6	0.5	0.4	5.2	0.8	4.3	0.7	0.3	0.5	1.5	9.5
DIP(リン) (μg-at/L)	0.3	0.3	0.1	0.4	0.7	0.3	0.8	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5
プランクトン ^{※2} (ml/m ³)	9.7	10.3	3.6	4.8	17.5	13.3	17.0	13.3	10.9	4.2	10.5	11.4

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移