

海況情報（第9報） -令和7年1月30日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：10地点平均は10.2℃で、前回調査時（12月2日、以下同様）より5.4℃低く、
 平年並みとなっています。

比重：10地点平均は23.1で、前回調査時より1.6高く、平年よりかなり高めとなっています。

DIN(窒素)：10地点平均は0.3μg-at/L で、前回調査時より2.7μg-at/L低く、
 平年よりやや低めとなっています。

DIP(リン)：10地点平均は0.3μg-at/Lで、前回調査時より0.2μg-at/L低く、
 平年よりやや低めとなっています。

プランクトン沈殿量：10地点平均は279.7mL/m³ で、前回調査時より167.9mL/m³多く、
 平年より甚だ高めとなっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値※3
水温 (°C)	10.2	11.1	11.2	11.0	8.8	9.8	9.1	9.6	10.0	11.6	10.2	9.8
比重	23.0	23.4	23.6	23.5	22.2	23.0	22.7	23.0	23.1	23.7	23.1	22.4
DIN(窒素)※1 (μg-at/L)	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	1.0	0.6	0.1	0.3	0.3	6.1
DIP(リン) (μg-at/L)	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6
プランクトン※2 (mL/m ³)	345.3	149.1	103.0	108.5	315.7	393.9	454.5	478.8	351.5	97.0	279.7	56.4

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移