


海況情報（第10報） -令和 7 年2月28日調査分-

佐賀県有明水産振興センター

- 水 温 : 10地点平均は9.8℃で、前回調査時（1月30日、以下同様）より0.4℃低く、
 平年よりやや低めとなっています。
- 比 重 : 10地点平均は23.1で、前回調査時と同じ値で、平年よりかなり高めとなっています。
- DIN(窒素) : 10地点平均は0.0μg-at/L で、前回調査時より0.3μg-at/L低く、
 平年よりやや低めとなっています。
- DIP(リン) : 10地点平均は0.1μg-at/Lで、前回調査時より0.2μg-at/L低く、
 平年よりやや低めとなっています。
- プランクトン沈殿量 : 10地点平均は484.7mL/m³ で、前回調査時より205.0mL/m³多く、
 平年より甚だ高めとなっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水 温 (℃)	10.0	9.7	9.8	9.6	9.9	9.6	9.7	9.6	9.6	10.0	9.8	10.5
比 重	23.0	23.0	23.6	23.2	22.6	23.2	22.6	22.9	22.8	23.8	23.1	22.3
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
DIP(リン) (μg-at/L)	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
プランクトン ^{※2} (mL/m ³)	502.9	412.1	309.1	406.1	539.1	484.8	768.4	551.5	666.7	206.1	484.7	82.1

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移