

海況情報（第11報） -令和7年2月17日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水温：9地点平均は10.1℃で、前回調査時（1月19日、以下同様）より0.7℃低く、
 平年並となっています。

比重：9地点平均は23.0で、前回調査時より0.4高く、平年並となっています。

DIN(窒素)：9地点平均は0.3μg-at/Lで、前回調査時より2.7μg-at/L低く、
 平年と比べてやや低めとなっています。

DIP(リン)：9地点平均は0.2μg-at/Lで、前回調査時より0.3μg-at/L低く、
 平年並となっています。

プランクトン沈殿量：9地点平均は399.9mL/m³で、前回調査時より255.1mL/m³多く、
 平年と比べて甚だ高めとなっています。



■ DIN（窒素）の表層における水平分布


■ 表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値 ^{※3}
水温 (°C)	9.8	10.0	10.3	10.1	10.4	10.2	10.1	10.1	10.2		10.1	9.6
比重	22.6	22.9	23.4	23.5	22.7	23.3	22.9	22.8	22.9		23.0	22.0
DIN(窒素) ^{※1} (μg-at/L)	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	1.1	0.1	0.4	時化のため欠測	0.3	3.0
DIP(リン) (μg-at/L)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2		0.2	0.3
プランクトン ^{※2} (mL/m ³)	732.9	481.8	200.0	167.3	316.1	232.7	492.4	351.5	624.2		399.9	87.8

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。

※2 プランクトンは24時間後の沈殿量です。

※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■ 10地点平均値（表層）の月別推移