

各関係機関長 様

佐賀県農業技術防除センター所長

タマネギ細菌性病害（腐敗病）の防除対策の徹底について

県内のタマネギ圃場で腐敗病の発生が増加していますので、下記を参考に防除対策を徹底するよう、生産者への指導をお願いします。

記

1. 発生概況（令和7年3月5日調査）

定期調査における平均発生株率は0.12%（発生圃場率35%）と、前回調査（2月17～20日）の0.04%（発生圃場率16.7%）から増加した。



写真 タマネギ腐敗病（令和7年3月5日撮影）

2. 防除対策

- (1) 発病株は伝染源となるため、速やかに抜き取り、圃場外に持ち出し適切に処分する。
- (2) 排水不良は本病の発生を助長するので、明渠の点検・補修等により、圃場排水対策を徹底する。
- (3) 過剰な追肥は本病の発生を助長するので避ける。
- (4) 強風雨等による傷口から侵入するため、強風雨の前後に薬剤散布を行う。
- (5) ネギアザミウマによる食害痕から感染する場合がありますので、本虫の防除も併せて行う。

連絡先：佐賀県農業技術防除センター 病害虫防除部

〒840 - 2205 佐賀市川副町南里1088

TEL (0952)45 - 8153 FAX (0952)45 - 5085

Mail nougyougijutsu@pref.saga.lg.jp

ホームページアドレス <https://www.pref.saga.lg.jp/kiiji00321899/index.html>

病害虫総合防除計画掲載アドレス <https://www.pref.saga.lg.jp/kiiji003101844/index.html>

防除セQRコード



防除計画QRコード

