

米づくり情報(平坦部) 第9号

令和8年8月27日

佐賀県農業試験研究センター 本場

本年産水稻の生育状況 (8月27日)

移植日	項目 品種	年次	草丈 cm	茎数 本/m ²	葉齢 L	葉色 SPAD	概況 (平年または平均との比較)
6月18日	夢しずく	本年 平年 平年比(差)	出穂期:8月15日 8月17日 (-2)			[気象] 8月20日～8月26日まで ◆平均気温…3.9℃高い ◆日照時間…長い(平年比139%) ◆降水量…少ない(平年比4%)	
	ヒノヒカリ	本年 平年 平年比(差)	出穂期:8月25日 8月27日 (-2)			[生育] ◆草丈 「さがびより」はやや低く、「ヒヨクモチ」は平年並み。	
	ひなたまる	本年 平均(2か年) 平均比(差)	出穂期:8月26日 8月25日 (+1)			◆茎数 「さがびより」は平年並み、「ヒヨクモチ」は多い。 ◆葉齢 「さがびより」の主稈葉数は平年並み。 「ヒヨクモチ」の葉齢はやや多い。	
6月19日	さがびより	本年 平年 平年比(差)	91.6 93.4 98	441 442 100	止葉葉位 15.1 15.0 (+0.1)	37.3 35.7 (+1.6)	◆葉色(SPAD値) 「さがびより」はやや濃く、「ヒヨクモチ」はやや淡い。 ◆「さがびより」は走り穂が見られており(出穂期予測:8月29日頃)、「ヒヨクモチ」は主茎の葉耳間長が3.2cmとなっている(出穂期予測:9月5日頃)。
	ヒヨクモチ	本年 平年 平年比(差)	78.4 78.5 100	711 520 137	15.9 15.6 (+0.3)	35.9 36.7 (-0.8)	
留意点 ○「ヒノヒカリ」、「ひなたまる」は出穂期を迎えており、「さがびより」もまもなく出穂期を迎える。 ○施肥管理:「ヒヨクモチ」専用の全量元肥肥料を使用した圃場では、幼穂形成期～穂ばらみ期頃に葉色の低下がみられる場合は追肥を施用する。 ○水管理: 幼穂形成期～出穂期が最も要水量が多い時期であるため、穂揃期までは間断灌水の湛水期間を長めにするように心がける(用水が不足している地域では、最低でも黒乾状態とし、できれば湿潤とすることが望ましい)。穂揃期以降は通常の間断灌水に切り替え、土壌を固めるとともに根の活力維持を図る。 ○病虫害発生予察情報予報第5号(9月の予報)で、普通期水稻では、トビイロウンカ“やや多”、コブノメイガ“多”、斑点米カメムシ類“多”となっている。地域での発生状況を確認し、適期防除に努める。 ●病虫害に関する情報は以下のリンク(農業技術防除センター病虫害防除部)より確認ください。 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00321899/index.html							

注1)「夢しずく」、「ヒノヒカリ」、「ひなたまる」は、6月18日移植の稚苗(播種期5/25、播種量 湿粳 180g/箱)

「さがびより」、「ヒヨクモチ」は、6月19日移植の稚苗(播種期5/26 播種量 湿粳 180g/箱)

2)栽植密度:「夢しずく」は、条間30cm×株間17cm, 19.6株/m²(65株/坪)

「ひなたまる」は、条間30cm×株間18cm, 18.5株/m²(60株/坪)

「さがびより」は、条間30cm×株間20cm, 16.7株/m²(55株/坪)

「ヒノヒカリ」「ヒヨクモチ」は、条間30cm×株間15cm, 22.2株/m²(73株/坪)

3)栽培管理:施肥法は県基準に準じ、防除他はセンターの慣行による。

4)平年値は、収量について過去の全試験年次の標準偏差(σ)を算出し、±1σの外側にある年次を除く年次を対象にした、各項目の単純平均値。

- 5)「ひなたまる」については R6 年産から試験開始のため、過去2か年の平均値との比較。
 6)概況欄の平年値との比較については、以下のように定義している。
 低い(少ない):94 以下、やや低い(やや少ない):95～98、平年並み:99～101、
 やや高い(やや多い):102～105、高い(多い):106 以上。

【幼穂形成始期と出穂期】

品 種	幼穂形成期(1mm)		出穂期	
	本年(平年差)	平年	本年(平年差)	平年
夢しずく	7/27 (-1)	7/28	8/15 (-2)	8/17
ヒノヒカリ	8/4 (±0)	8/4	8/25(-2)	8/27
ひなたまる	8/5 (+2)	8/3	8/26(+1)	8/25
さがびより	8/8 (-1)	8/9	未	9/1
ヒヨクモチ	8/15 (+1)	8/14	未	9/5

【窒素の時期別施用量(N kg／10a)】




品 種	基 肥	中 追	穂肥Ⅰ	穂肥Ⅱ	実 肥
夢しずく	3.0	0.0	2.0 (7/30)	—	—
ヒノヒカリ	4.0	2.0 (7/10)	3.0(8/7)	—	—
ひなたまる	4.0	2.0 (7/10)	3.0(8/7)	—	—
さがびより	5.0	0.0	2.0(8/17)	—	—
ヒヨクモチ	4.0	3.0 (7/16)	4.0(8/20)	1.5(8/27)	1.5

※括弧内の日付は農試作況圃場における施用日

令和8年産 稲作期間気象図


アメダス観測値(佐賀)

農業試験研究センター
作物栽培研究担当




【生育状況の比較】


「夢しずく」




「ヒノヒカリ」



「ひなたまる」



「さがびより」



「ヒヨクモチ」

