

【赤かび防除について】

生育が早まっているため、赤かび防除の時期についても防御適期が前倒しになる見込みである。

以下の表を参考に、生育に合わせた防除計画を立てる。

令和2年産小麦出穂期予測（地点：佐賀）

品種：シロガネコムギ					品種：チクゴイズミ			
播種日	茎立日	出穂期	開花期	成熟期	茎立日	出穂期	開花期	成熟期
11月1日	1月5日	2月26日	3月24日	5月6日	1月7日	2月29日	3月26日	5月15日
(平年値)	(1月14日)	(3月22日)	(4月11日)	(5月15日)	(1月19日)	(3月27日)	(4月13日)	(5月22日)
11月6日	1月12日	3月4日	3月30日	5月9日	1月17日	3月8日	4月1日	5月17日
(平年値)	(1月26日)	(3月27日)	(4月13日)	(5月17日)	(1月31日)	(3月30日)	(4月14日)	(5月23日)
11月11日	1月22日	3月10日	4月3日	5月11日	1月25日	3月15日	4月5日	5月18日
(平年値)	(2月6日)	(3月31日)	(4月16日)	(5月19日)	(2月10日)	(4月1日)	(4月16日)	(5月24日)
11月16日	1月28日	3月18日	4月7日	5月14日	2月1日	3月20日	4月8日	5月20日
(平年値)	(2月14日)	(4月3日)	(4月17日)	(5月21日)	(2月18日)	(4月5日)	(4月17日)	(5月25日)
11月21日	2月3日	3月21日	4月9日	5月15日	2月9日	3月23日	4月9日	5月21日
(平年値)	(2月21日)	(4月6日)	(4月19日)	(5月23日)	(2月24日)	(4月7日)	(4月19日)	(5月26日)
11月26日	2月12日	3月26日	4月11日	5月18日	2月15日	3月28日	4月13日	5月22日
(平年値)	(2月27日)	(4月9日)	(4月21日)	(5月24日)	(2月29日)	(4月8日)	(4月20日)	(5月26日)
12月1日	2月16日	3月30日	4月15日	5月20日	2月21日	4月1日	4月15日	5月23日
(平年値)	(3月2日)	(4月10日)	(4月22日)	(5月25日)	(3月5日)	(4月10日)	(4月21日)	(5月27日)
12月6日	2月21日	4月1日	4月16日	5月21日	2月24日	4月3日	4月16日	5月24日
(平年値)	(3月7日)	(4月12日)	(4月24日)	(5月27日)	(3月9日)	(4月11日)	(4月23日)	(5月28日)
12月11日	2月25日	4月5日	4月19日	5月23日	2月27日	4月5日	4月18日	5月25日
(平年値)	(3月11日)	(4月14日)	(4月25日)	(5月27日)	(3月12日)	(4月13日)	(4月23日)	(5月28日)

予測に用いた気温は、2020年3月1日までは観測値、3月15日までは予報値、その後は平年値。

最新の予測は、九州沖縄農業研究センターHPより閲覧できます。

http://www.naro.affrc.go.jp/org/warc/meteo_fukuyama/WEB/wheat/index_mugi.html