

佐賀県特別栽培農産物認証制度に対応したナス病害虫の総合防除体系（例）

区分	病害虫	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			散布成分回数
		中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上				
		育苗			本圃																														終了
病害	発消長																																		
	すずかび病																															5			
	灰色かび病																															4			
	その他菌核病																															0			
虫害	発消長																																		
	アザミウマ類	コテツフ			モンSP	同時防除	アムFEC		ハチハチ	EC	プレOF	スWDG	プレOF	同時防除		コテツフ	同時防除	同時防除	同時防除		プレOF	同時防除	同時防除	同時防除	アムFEC	同時防除	同時防除	同時防除	モンSP	スWDG	同時防除	10			
	コナジラミ類				ベドSG		スWDG	同時防除						ボタニガ	ドES				ボタニガ	ドES	ベドSG				ボタニガ	ドES	ボタニガ	ドES	ボタニガ	ドES		スWDG	4		
	ハダニ類	同時防除	ダニサ			同時防除	カネマイ				コロマイ	EC				ダニサ		同時防除						マイネコ									4		
	ハモグリハエ類		トリガ		カスケ																												2		
	ヨトウ類	同時防除																															0		
成分回数合計		5						9						6						9			29												

注1) 散布回数のカウントは苗から開始。農業の剤型 WP:水和剤、L:液剤、EC:乳剤、SP:水溶剤、WDG:顆粒水和剤、F:フロアブル、DF:ドライフロアブル、G:粒剤。

注2) :カウントされない農薬(天敵、天然系農薬等の非化学合成農薬)

注3) 本圃の土壌消毒に薬剤を使用する場合は散布回数に別途加算が必要。