

## 大麦定期調査結果（令和6年5月上旬）

調査月日：5月7日～8日		50茎調査		
地点名	病害虫名	赤かび病 (%)	アブラムシ類 (%)	備考 <sup>1) 2)</sup>
鳥栖市 1		0	0	調査外赤かび
鳥栖市 2		4	0	
吉野ヶ里町 1		0	0	
吉野ヶ里町 2		0	0	
神崎市千代田町 1		0	0	調査外赤かび
神崎市千代田町 2		0	0	
佐賀市蓮池町 1		0	0	
佐賀市蓮池町 2		0	0	調査外赤かび
佐賀市東与賀町 1		0	0	
佐賀市東与賀町 2		0	0	
小城市芦刈町 1		0	0	
小城市芦刈町 2		6	0	
小城市三日月町 1		0	0	
小城市三日月町 2		2	0	
白石町新明 1		0	0	
白石町新明 2		2	0	
鹿島市 1		0	0	
鹿島市 2		6	0	
多久市 1		0	0	
多久市 2		0	0	
武雄市 1		2	0	
武雄市 2		0	0	調査外赤かび
発生圃場率		27.3	0	
平均発生茎率		1.0	0	
発生率の平年値		0.2	4.1	
(平年比)		多	やや少	
発生率の前年値		0.3	0.7	

1) 網斑病およびうどんこ病は茎葉の黄化により調査不可

2) 調査外：50茎以外の補足調査により認めた。