

普通期水稻定期調査結果(令和6年6月)

25株調査

調査月日：6月14日～21日

| 調査地点 | 品種 | 葉いもち | | 残り苗に おけるい もち病の 有無 | セジロウンカ | | | トビイロウンカ | | | ヒメビウカ | | | コブノメイガ | | スクミン ゴカイ 1m ² 当 頭数 | | |
|---------|----|----------|----------|----------------------------|----------|------|----|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|----|--|----------|----------|
| | | 発生 株率 | 発病 程度 | | 寄生 株率 | 最高頭数 | | 幼虫 の齢 | 寄生 株率 | 最高頭数 | | 幼虫 の齢 | 寄生 株率 | 最高頭数 | | | 発生 株率 | 被害 程度 |
| | | | | | | 成虫 | 幼虫 | | | 成虫 | 幼虫 | | | 成虫 | 幼虫 | | | |
| A地区 | ① | 夢しずく | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 15 | | |
| " | ② | 夢しずく | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 8 | | |
| " | ③ | 夢しずく | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 3 | | |
| " | ④ | さがびより | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 7 | | |
| B地区 | ① | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ② | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ③ | ヒノヒカリ | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ④ | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| C地区 | ① | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ② | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ③ | ヒヨクモチ | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ④ | ヒヨクモチ | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| D地区 | ① | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ② | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ③ | ヒヨクモチ | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ④ | ヒヨクモチ | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| E地区 | ① | | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ② | | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ③ | | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ④ | | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| F地区 | ① | | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ② | | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ③ | | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ④ | | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| G地区 | ① | | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 12 | | |
| " | ② | | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 9 | | |
| " | ③ | | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 15 | | |
| " | ④ | | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 2 | | |
| H地区 | ① | | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1 | | |
| " | ② | | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 7 | | |
| " | ③ | | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 17 | | |
| " | ④ | | 0 | 無 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 6 | | |
| I地区 | ① | さがびより | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | - | | |
| " | ② | ヒヨクモチ | (未移植) | | | | | | | | | | | | | - | | |
| " | ③ | さがびより | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | - | | |
| " | ④ | さがびより | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | - | | |
| J地区 | ① | 夢しずく | 0 | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| " | ② | ヒノヒカリ | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ③ | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ④ | ヒヨクモチ | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K地区 | ① | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ② | ヒヨクモチ | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | ③ | 夢しずく | 0 | 無 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| " | ④ | さがびより | (未移植) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L地区 | ① | 夢しずく | 0 | 無 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| " | ② | ヒノヒカリ | 0 | 無 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| " | ③ | 夢しずく | 0 | 無 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| " | ④ | さがびより | 0 | 無 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 発生圃場率 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 66.7 | | |
| 平均発生率 | | | 0.0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 5.7 | | |
| 発生率の平年値 | | | 0.4 | | 1.0 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0 | | 5.7 | | |
| (平年比) | | | やや少 | | 並 | | | 並 | | | 並 | | | 並 | | 並 | | |
| 発生率の前年値 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 4.3 | | |

※スクミンゴカイの1m²あたり頭数は、過去4年分(R2~R5)の平年値。"- "は濁水等により計数できなかったことを示す。