




図 トビイロウンカ各世代の発生予測（第2版、2025年7月18日作成）

1. 6月16日頃、6月22日～23日（図では6月23日）の飛来虫を起点とし、トビイロウンカの有効積算温度及び佐賀市川副町のアメダスデータ（7月18日以降は平年値）に基づき作成した。三角法を用い、発育零点 12℃、発育上限温度 28℃、発育停止温度 33℃とした。
2. 田植え時期、品種等の違いによって、本虫の発生量は異なるので、必ず圃場ごとの発生状況を確認したうえで、防除対策を講じる。
3. 今後の気象経過等に応じて、**本図は随時、更新するので、最新情報は、農業技術防除センターのホームページで確認**する。

【第1版からの変更点】

飛来時期	予測時期	変更点	第1版	第2版
6月16日 飛来	第1世代幼虫	—	7/1-7/14	7/1-7/14
	第2世代幼虫	早期化(約1日)	7/30-8/12	7/29-8/11
	第3世代幼虫	早期化(約1日)	8/29-9/11	8/28-9/10
	第4世代幼虫	早期化(約1日)	9/30-10/23	9/29-10/21
6月23日 飛来	第1世代幼虫	早期化(約1日)	7/9-21	7/8-21
	第2世代幼虫	早期化(約1日)	8/6-20	8/5-19
	第3世代幼虫	早期化(約1日)	9/5-19	9/4-18