

カンキツ定期調査結果（令和7年7月）

農業技術防除センター

調査月日：太良町 7月22日、唐津市 7月23日、佐賀市 7月17日、鹿島市 7月16日

調査地点	病害虫名	そうか病		かいよう病		黒点病	ミカンハダニ	チャ/キロアザミマ	備考
		100葉	100果	100葉	100果	100果	100葉	100果	
佐賀市大和町 1		0	0	0	0	4	33	2	晩生 ナシマル3/100果
佐賀市大和町 2 ※		0	0	1	0.1	2	3	0	晩生
唐津市 1		0	1	0	0	3	0	1	極早生
唐津市 2		0	0	0	0	15	0	1	早生
鹿島市 1		0	0	0	0	7	2	0	極早生 番外果実 かいよう病
鹿島市 2		0	1	0	0	33	44	1	極早生 黒点1果 は中発生
太良町 1		0	0	0	0	12	0	3	早生
太良町 2		0	0	1	1	5	8	1	早生
発生圃場率		0	25.0	25.0	25.0	100.0	62.5	75.0	
平均発生率		0	0.3	0.3	0.14	10.1	11.3	1.1	
発生率の平年値		0	0	0.1	0	5.7	2.8	0.2	
（平年比）		並	多	多	多	並	多	多	
発生率の前年値		0	0.0	0.5	0.01	10.3	9.9	0.1	

ミカンハモグリガ、ミカンサビダニ、カイガラムシ類、アブラムシ類等の被害については調査葉数（または果数）及び被害（寄生）葉数（または果数）を備考に記入する。

※佐賀市大和町2の圃場では、調査対象外でかいよう病の発病が確認されたため、旧葉1,000枚を調査した。