

ナシ定期調査結果（令和7年7月下旬）

調査月日：7月17日							
調査 地点	病害虫名	黒星病		ハダニ類	アブラムシ類	チュウゴク ナシキジラミ	その他病害虫等
		100葉	100果	100葉	100葉	100葉	
南波多町 1-1		0	0	29	0	0	露地・幸水 ハスモンヨトウ卵塊 1
松浦町 1-1		0	0	14	0	0	露地・幸水 番外に赤星病病斑
松浦町 2-1		0	0	75	0	1	露地・幸水 番外に赤星病病斑
大川町 2		0	0	69	0	1	露地・幸水
大川町 3-1		0	0	2	0	0	露地・幸水
南波多町 1-2		0	0	1	0	0	トンネル・幸水
松浦町 1-2		0	0	67	0	1	トンネル・幸水
松浦町 2-2		0	0	87	0	0	トンネル・幸水
大川町 3-2		0	0	82	0	0	トンネル・幸水
発生圃場率（露地）		0	0	100.0	0	40.0	
平均発生率（露地）		0	0	37.8	0	0.4	
（トンネル）		0	0	59.3	0	0.3	
（露地＋トンネル）		0	0	47.3	0	0.3	
発生率の平年値		1.6	0.3	4.0	0.0	1.7	
平年比		やや少	並	多	並	やや少	
発生率の前年値		0.4	0	15.4	0	0.4	
前年比		並	並	多	並	並	

赤星病、輪紋病、黒斑病等の被害については調査葉数（または果数）及び被害（寄生）葉数（または果数）を「その他病害虫等」に記入する。