

ブドウ定期調査結果（令和7年7月）

調査月日：唐津市7月23日、伊万里市7月17日、鹿島市7月16日						
	病害虫名	黒とう病	べと病	褐斑病	枝膨病	備考
		100葉	100葉	100葉	100新鞘	
唐津市 1		0	0	0	0	トンネル
唐津市 2		0	33	0	0	露地
伊万里市 1		0	7	0	0	露地
伊万里市 2		0	0	0	0	トンネル
鹿島市 1		0	8	0	0	露地 番外ハマキ
鹿島市 2		0	18	0	0	露地
発生圃場率		0	66.7	0	0	
平均発生率		0	11.0	0	0	
発生率の平年値		0.7	3.8	0.0	－	
(平年比)		並	多	並	－	
発生率の前年値		4.3	14.0	0.0	－	
(7月の値) 平年値	やや多の上限	2.5	9.3	0.0		
	並の上限	1.4	6.0	0.0		
	並の下限	-0.0	1.6	0.0		
	やや少の下限	-1.1	-1.7	0.0		
(8月の値) 平年値	やや多の上限	2.2	7.1	0.4		
	並の上限	1.4	5.0	0.2		
	並の下限	0.4	2.0	-0.0		
	やや少の下限	-0.4	-0.1	-0.2		