

早植え水稻定期調査結果(令和7年8月上旬)

25株調査

調査月日：8月4日																					
調査地点		品種	葉いもち		紋枯病		セジロウンカ			トビイロウンカ					ヒメトビウンカ		コブノメイガ		フナエビヤガ	備考	
			発生株率	発病程度	発生株率	発病程度	寄生株率	最高頭数 成虫	最高頭数 幼虫	幼虫の齢	寄生株率	最高頭数 成虫	最高頭数 幼虫	幼虫の齢	短翅雌成虫	寄生株率	最高頭数 成虫	最高頭数 幼虫	発生株率		被害程度
D地区	①	コシヒカリ	0		0		0			0					0			0		0	内穎褐変病8%
	②	コシヒカリ	0		0		0			0					0			0		0	
	③	夢しずく	0		0		0			0					0			0		0	
	④	夢しずく	12	少	0		0			0					0			0		0	
E地区	①	コシヒカリ	0		0		0			0					0			0		0	
	②	夢しずく	0		0		0			0					0			0		0	
	③	夢しずく	0		0		0			0					0			0		0	
	④	夢しずく	0		0		0			0					0			0		0	
F地区	①	コシヒカリ	0		0		0			0					0			0		0	内穎褐変病4%
	②	夢しずく	0		0		0			0					0			0		0	
	③	コシヒカリ	0		0		0			0					0			0		0	内穎褐変病4%
	④	コシヒカリ	0		0		0			0					0			0		0	
発生圃場率			8.3		0		0.0			0					0		0		0		
平均発生率			1.0		0		0			0					0		0.0		0		
発生率の平年値			2.6		0.5		6.8			1.6					5.3		2.9		3.5		
(平年比)			並		やや少		やや少			並					やや少		やや少		やや少		
発生率の前年値			0.3		0		3.3			0					1.3		7.0		0		

