

## ナシ定期調査結果（令和8年5月下旬）

調査月日：5月19日							
調査地点	病害虫名	黒星病		ハダニ類	アブラムシ類	チュウゴクナシキジラミ	その他病害虫等
		100葉	100果	100葉	100葉	新梢100本	
南波多町1-1		0	0	0	0	0	露地・幸水
松浦町1-1		0	0	0	0	0	露地・幸水
松浦町2-1		0	0	0	0	0	露地・幸水
大川町2		0	0	0	1	0	露地・幸水
大川町3-1		0	0	1	0	0	露地・幸水
南波多町1-2		0	0	2	0	0	トンネル・幸水
松浦町1-2		0	0	0	0	0	トンネル・幸水
松浦町2-2		-	-	-	-	-	薬散中 トンネル・幸水
大川町3-2		0	0	0	0	0	トンネル・幸水
発生圃場率（露地）		0	0	20.0	20.0	0	
平均発生率（露地）		0	0	0.2	0.2	0	
（トンネル）		0	0	0.7	0	0	
（露地+トンネル）		0	0	0.4	0.1	0	
発生率の平年値		0.3	0.2	0.2	0.05	0.2	
平年比		やや少	やや少	並	多	やや少	
発生率の前年値		0	0	1.0	0	0.2	
（5月の値） 平年値	やや多の上限	0.8	0.7	0.8	0.2		
	並の上限	0.5	0.4	0.4	0.1		
	並の下限	0.1	0.0	-0.0	-0.0		
	やや少の下限	-0.2	-0.3	-0.4	-0.1		
（6月の値） 平年値	やや多の上限	2.2	0.7	6.3	0.7		
	並の上限	1.3	0.4	3.7	0.4		
	並の下限	0.2	0.0	0.1	-0.1		
	やや少の下限	-0.7	-0.3	-2.5	-0.4		

赤星病、輪紋病、黒斑病等の被害については調査葉数（または果数）及び被害（寄生）葉数（または果数）を「その他病害虫等」に記入する。