

早期水稻定期調査結果(令和8年8月)

25株調査

調査月日：8月5日																			
調査地点		穂いもち		紋枯病		セジロウンカ			トビイロウンカ			ヒメビロウンカ			コブノメイガ		備考		
		発生株率	発病程度	発生株率	発病程度	発生株率	最高頭数 成虫	最高頭数 幼虫	幼虫の齢	発生株率	最高頭数 成虫	最高頭数 幼虫	幼虫の齢	発生株率	最高頭数 成虫	最高頭数 幼虫		発生株率	被害程度
A 地区	①コシヒカリ	0		8	中	0				0				0			0		内穎褐変病12%、イネカマムシ4%
	②コシヒカリ	0		0		0				0				0			0		内穎褐変病8%
	③コシヒカリ	0		0		0				0				0			4		内穎褐変病8%
	④コシヒカリ	0		0		0				0				0			8		内穎褐変病4%
B 地区	①コシヒカリ	0		0		20	1	1	中	0				0			44		内穎褐変病8%、区外に紋枯病
	②コシヒカリ	0		0		0				0				0			16		内穎褐変病8%、こま葉枯病4%
	③コシヒカリ	0		0		8		1	中	0				0			8		内穎褐変病8%
	④コシヒカリ	0		0		0				0				0			28		内穎褐変病12%
C 地区	①コシヒカリ	収穫済み																内穎褐変病8%、イネカマムシ4% 内穎褐変病4%、イネカマムシ4% 内穎褐変病20%	
	②コシヒカリ	0		0		0				0				0			0		
	③コシヒカリ	0		0		0				0				0			0		
	④コシヒカリ	0		0		0				0				0			0		
発生圃場率		0		9.1		18.2			0			0			54.5				
平均発生率		0		0.7		2.5			0			0			9.8				
発生率の平年値		4.4		2.1		3.2			11.6			1.8			0.59				
(平年比)		やや少		やや少		並			並			やや少			多				
発生率の前年値		8.0		0.3		0.7			0			1.0			0				