

米づくり情報（NO. 1）

令和2年6月19日

伊万里・西松浦地区農業技術者連絡会作物部会

1 気象概況（アメダス観測地：伊万里）

月	半旬	平均気温		最高気温		最低気温		降水量		日照時間	
		平年値 ℃	本年値 ℃	平年値 ℃	本年値 ℃	平年値 ℃	本年値 ℃	平年値 mm	本年値 mm	平年値 時間	本年値 時間
5月	5	19.0	19.4	24.5	25.6	14.0	13.6	27.8	0.0	31.1	42.6
	6	19.7	20.0	25.2	25.6	14.8	14.8	29.3	3.5	37.4	33.5
6月	1	20.4	22.6	25.9	27.7	15.8	17.8	27.3	1.0	29.4	28.4
	2	21.1	23.6	26.2	29.7	16.7	18.7	34.8	0.0	26.3	44.1
	3	21.7	25.3	26.5	27.7	17.7	23.1	47.7	121.5	23.5	6.8
	4	22.3	—	26.8	—	18.8	—	66.0	—	20.6	—
	5	23.1	—	27.1	—	19.9	—	84.8	—	16.8	—
	6	23.8	—	27.7	—	20.8	—	92.5	—	15.4	—

- ・5月3～6半旬の気温は平年並みであったが、6月1～3半旬の気温は、平年に比べ2℃ほど高く推移した。
- ・5月3半旬～6月3半旬の降水量はやや多く（平年対比132%）、日照時間は平年並みで推移した。

2 生育状況（6月19日）

項目 品種(設置場所)	年次	草丈 cm	莖数 本/m ²	主稈 出葉数L	葉色 SPAD	概要
夢しずく 6/1 移植 東山代町脇野	本年値	33.3	128	6.9	37.6	<ul style="list-style-type: none"> ・草丈は平年よりやや高い ・莖数は、平年並み ※今年度は疎植のため平年比が少なくなっている。 ・主稈出葉数は平年並み
	平年値	31.2	196	6.8	39.1	
	平年比	107	65	+0.1	—	

（耕種概要）

品 種	年 次	苗 質		移植日 (月日)	栽植密度 (株/m ²)	備考
		苗丈	葉令			
夢しずく	本年値	15.6	2.5	6月1日	15.8	前作 水稻
	平年値	14.5	2.7	5月29日	18.4	前作 水稻

※夢しずくの平年値はH22～R1の平均値

3 今後の管理

1) 山間早植え水稻（5月上旬移植）

- ・今年度は、移植後の気温が平年より高く推移しているため、すでに有効莖を確保できている圃場が多い。有効莖が確保できた圃場から順次中干しに移行する。6月下旬には、幼穂形成始期直前となり稲の用水要求度が高い時期となるため中干しが遅れないよう留意する。
- ・莖数が多い圃場では、今後「いもち病」の発生に留意し、進展型が見られた場合にはオリブラ

イト粒剤等により防除を実施する。

2) 普通期水稻「夢しずく」

- 分げつ期を迎えている。水管理は浅水管理とし、分げつ促進に努める。
ガス対策として移植後15日、25日頃は夜干しなどを行い、根の活力を高める。
ただし、用水確保が難しい地域では落水せずに湛水状態を保つようにする。
- 一部圃場においてヒエやコナギ、ホタルイ等の発生が散見される。今後は、中後期除草剤により適期に防除を実施する。

3) 共通

○雑草管理

- 除草剤散布時に水深が確保できなかった圃場や、散布後に水が確保できなかった圃場で雑草の発生が見られる場合は、中後期除草剤による対応を行う。
- 用水確保が難しい圃場においては落水処理のできる除草剤、用水が確保できる圃場は粒剤等の中後期除草剤を選択し適切に防除を実施する。

○病虫害防除

- 佐賀県農業技術防除センター6月発生予報（5月28日付け）では、葉いもちの発生は、早植えでは「やや多」、普通期では「平年並」となっており、スクミリンゴガイの発生は「平年より多」と報告されている。圃場の発生状況を確認し適期防除に努める。
- 6月19日までのBLASTAM情報（気象条件のみによって葉いもちの発生を予測するシステム）によると、伊万里で6月19日に葉いもちの初発生が予測されている。今後発生状況に注意し、病斑が確認された圃場では速やかに防除を行う。
- 圃場内に放置されている補植苗は「いもち病」や「ごま葉枯病」の温床になるためすみやかに除去する。



補植苗で見られたいもち病の病斑

(ウンカ類)

佐賀県嬉野市では、6月11日に11頭のトビイロウンカの飛来が確認されている。今後の飛来状況や圃場条件（移植時期や品種、圃場の場所等）によってウンカ類の発生量は異なるため、注意深く圃場を観察する。

（※長崎県諫早市でも、平年より早い6月11日にトビイロウンカの誘殺が確認されている。）

令和2年産水稲生育期間気象グラフ（アメダス：伊万里）

西松浦農業改良普及センター

