

# 人 口 動 態 総 覧

佐賀県

	実 数			率				全国 順位	26年平均 発生間隔  時 分 秒
	平成26年	平成25年	増 減	平成26年	平成25年	対前年比 25年=100	全国26年		
出 生	7 159	7 276	△ 117	8.6	8.7	99.0	8.0	6	1 13 25
(男)	(3 667)	(3 690)	(△ 23)	(9.4)	(9.4)	99.9	(8.4)	7	2 23 20
(女)	(3 492)	(3 586)	(△ 94)	(8.0)	(8.1)	98.0	(7.6)	8	2 30 31
死 亡	9 732	9 640	92	11.7	11.5	101.6	10.1	22	0 54 0
(男)	(4 801)	(4 715)	( 86)	(12.2)	(12.0)	102.3	(10.8)	21	1 49 29
(女)	(4 931)	(4 925)	( 6)	(11.2)	(11.1)	100.8	(9.5)	20	1 46 35
乳児死亡	9	23	△ 14	1.3	3.2	39.8	2.1	47	973 20 0
新生児死亡	5	8	△ 3	0.7	1.1	63.5	0.9	37	1752 0 0
自然増減	△ 2 573	△ 2 364	△ 209	△ 3.1	△ 2.8	109.5	△ 2.1	21	…
死 産	162	157	5	22.1	21.1	104.8	22.9	27	54 4 27
自然死産	74	65	9	10.1	8.7	115.6	10.6	29	118 22 42
人工死産	88	92	△ 4	12.0	12.4	97.1	12.3	22	99 32 44
周産期死亡	26	28	△ 2	3.6	3.8	94.4	3.7	28	336 55 23
妊娠満22週以後 の死産	23	21	2	3.2	2.9	111.3	3.0	18	380 52 10
早期新生児死亡	3	7	△ 4	0.4	1.0	43.6	0.7	42	2920 0 0
婚 姻	3 928	3 992	△ 64	4.7	4.8	99.0	5.1	23	2 13 49
離 婚	1 324	1 436	△ 112	1.59	1.72	92.8	1.77	37	6 36 59
合計特殊出生率	…	…	…	1.63	1.59	…	1.42	6	…
生活習慣病死亡									
悪性新生物	2 798	2 758	40	336.7	329.9	102.1	293.5	12	
心疾患	1 387	1 352	35	166.9	161.7	103.2	157.0	29	
脳血管疾患	880	880	0	105.9	105.3	100.6	91.1	22	

注：1) 出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率は人口千対、乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対、死産率は出産（出生＋死産）千対、周産期死亡率・妊娠満22週以後の死産率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対、生活習慣病死亡率は人口10万対である。

2) 合計特殊出生率とは、「15歳～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性とその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子供の数に相当する。

3) 全国順位は高率順位である。

4) ( ) はそれぞれ、出生と死亡の内数。

# 第1章 出生

## 1 出生の動き

平成26年の本県の出生数は7,159人で1時間13分25秒に1人の割合で生まれたことになり、前年より117人減少し、出生率（人口千対）は8.6で前年の8.7を下回った。

本県の出生率は戦後急激に上昇したが、昭和24年のベビーブームをピークにその後次第に低下した。37年以降は41年の「ひのえうま」を除いてほぼ横ばいであったが、50年以降徐々に低下し、平成15年からは戦後初めて自然増がマイナスに転じた。

出生率を全国と比較すると、図1のように昭和37年頃から全国より低率で推移していたが、54年からは再び高率となり平成26年は全国6位であった。

図1 出生数及び出生率の年次推移




表1 出生率・合計特殊出生率・総再生産率の年次推移

年次	出生率		合計特殊出生率		総再生産率	
	佐賀県	全国	佐賀県	全国	佐賀県	全国
昭和 22年	34.8	34.3	...	4.54	...	2.21
25	31.7	28.1	...	3.65	...	1.77
30	22.9	19.4	...	2.37	1.45	1.15
35	18.3	17.2	2.35	2.00	1.14	0.97
40	16.6	18.6	2.28	2.14	1.11	1.04
45	15.8	18.8	2.13	2.13	1.01	1.03
50	15.6	17.1	2.03	1.91	0.97	0.93
55	14.4	13.6	1.93	1.75	0.93	0.85
60	13.1	11.9	1.95	1.76	0.94	0.86
平成 2	10.9	10.0	1.75	1.54	0.84	0.75
7	9.9	9.6	1.64	1.42	0.80	0.69
12	10.0	9.5	1.67	1.36	0.80	0.66
17	8.7	8.4	1.48	1.26	0.73	0.62
22	9.0	8.5	1.61	1.39	0.79	0.67
24	8.9	8.2	1.61	1.41	0.80	0.68
25	8.7	8.2	1.59	1.43	0.81	0.70
26	8.6	8.0	1.63	1.42	0.82	0.69

## 2 合計特殊出生率

これからの人口の動向をみるものとして重要な合計特殊出生率（P7注:2）の平成26年は、1.63で前年の1.59を上回った。昭和50年までは2.0台で推移していたが、以後ほぼ低下し続け、平成17年の1.48は全国7位とはいえ過去最低を記録した。その後、1.51とわずかながら上昇に転じ、平成22年以降ほぼ横ばいで推移している。

平成26年の合計特殊出生率を母の年齢(5歳階級)別にみると、25～29歳、35～39歳、45～49歳の各階級で減少し、15～19歳、20～24歳、30～34歳、40～44歳の階級では上昇した。




表2 年齢階級別にみた合計特殊出生率の年次推移

佐賀県

母の年齢	昭和35年	40年	45年	50年	55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	24年	25年	26年
合計	2.35	2.28	2.13	2.03	1.93	1.95	1.75	1.64	1.67	1.48	1.61	1.61	1.59	1.63
15～19歳	0.0352	0.0156	0.0202	0.0160	0.0190	0.0204	0.0163	0.0192	0.0317	0.0273	0.0261	0.0205	0.0250	0.0279
20～24歳	0.5565	0.5652	0.4848	0.5363	0.4443	0.3813	0.2850	0.2544	0.2949	0.2619	0.2621	0.2461	0.2200	0.2334
25～29歳	1.0465	1.0753	1.0584	1.0162	0.9856	0.9743	0.7990	0.6801	0.5994	0.5016	0.5360	0.5373	0.5390	0.5308
30～34歳	0.5067	0.4923	0.4565	0.3763	0.4079	0.4750	0.5272	0.5336	0.5396	0.4668	0.5069	0.5179	0.4996	0.5300
35～39歳	0.1653	0.1126	0.0962	0.0779	0.0625	0.0910	0.1061	0.1385	0.1805	0.1987	0.2439	0.2443	0.2657	0.2585
40～44歳	0.0365	0.0197	0.0143	0.0116	0.0074	0.0108	0.0143	0.0167	0.0214	0.0212	0.0378	0.0465	0.0438	0.0459
45～49歳	0.0015	0.0008	0.0009	0.0006	0.0010	0.0007	0.0004	0.0007	0.0005	0.0005	0.0004	0.0008	0.0010	0.0004

表3 母の年齢階級別にみた出生数の年次推移

佐賀県


母の年齢	昭和35年	40年	45年	50年	55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	24年	25年	26年
合計	17,294	14,443	13,187	13,085	12,466	11,705	9,555	8,729	8,745	7,508	7,640	7,440	7,276	7,159
～19歳	296	147	170	109	119	123	105	119	180	133	111	90	110	117
20～24	4,341	3,730	3,692	3,647	2,630	2,087	1,470	1,422	1,529	1,226	1,037	935	836	887
25～29	7,744	6,452	6,007	6,707	6,578	5,691	4,214	3,490	3,248	2,540	2,449	2,364	2,264	2,123
30～34	3,648	3,249	2,615	2,107	2,738	3,123	2,972	2,787	2,718	2,494	2,542	2,486	2,398	2,438
35～39	1,058	743	609	436	353	616	696	795	944	1,001	1,308	1,319	1,435	1,344
40～44	197	118	89	74	42	61	96	111	123	111	191	242	228	248
45～49	8	4	5	4	6	4	2	5	3	3	2	4	5	2
50～	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 地域別にみた出生

地域別の出生状況は図3のとおりで、出生率は概ね市部が郡部より高くなっている。

平成26年の地域別の出生率をみると、鳥栖市の出生率が10.6と前年出生率1位であった神埼郡の出生率9.0を上回って第1位となり、東松浦郡が前年の7.2から8.8へと上昇し、神埼郡が10.9から9.0へと下降している。

図3 地域別出生率 平成26年 (佐賀県)



#### 4 出生順位

出生順位別出生割合の年次推移を図4でみると、昭和35年には第3子以上が全体の35.3%を占め、続いて第1子35.1%、第2子29.6%であったが、その後第3子以上の割合が急激に減少し、50年には第1子41.2%、第2子37.6%、第3子以上21.2%となった。

昭和55年から平成2年までは第1子はほぼ横ばい、第2子は減少、第3子以上は増加傾向にあったが、その後、第1子は増加、第2子は横ばい、第3子以上は減少傾向となった。平成14年の44.6%をピークに出生数に占める第1子の割合は低下傾向となり、平成26年は第1子42.2%、第2子34.4%、第3子以上23.4%となった。




表4 出生順位別にみた出生数の年次推移

佐賀県


出生順位	昭和35年	40年	45年	50年	55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	24年	25年	26年
総数	17 294	14 443	13 187	13 085	12 466	11 705	9 555	8 729	8 745	7 508	7 640	7 440	7 276	7 159
第1子	6 062	5 333	5 129	5 391	4 878	4 531	3 722	3 686	3 862	3 225	3 196	3 015	2 956	3 022
第2子	5 126	5 153	4 745	4 918	4 665	4 406	3 389	3 107	3 134	2 793	2 731	2 693	2 616	2 464
第3子	3 325	2 679	2 469	2 153	2 448	2 282	1 983	1 552	1 380	1 207	1 333	1 325	1 277	1 278
第4子	1 559	868	613	464	388	392	382	304	296	227	309	302	335	308
第5子以上	1 222	410	231	159	87	94	79	80	73	56	71	105	92	87

## 5 出生時の子の身長

平成26年の出生時の平均身長は49.1cmで、男49.3cm、女48.8cmとなっている。

また、身長別出生割合は図5のとおりで、50cmが22.6%で最も多く、続いて49cmが18.7%、51cmが14.8%となっている。

図5 身長別出生割合 平成26年（佐賀県）



## 6 出生時の子の体重

平成26年の出生時の平均体重は3.00kgで、男3.04kg、女2.96kgとなっている。

また、2,500g未満の低体重児の出生割合の年次推移を表5で見ると、昭和45年の6.9%から減少していたが、昭和60年以降増加傾向に転じ、その後概ね9%前後で推移し、平成26年は、9.4%となっている。

平成26年における低体重児の性別出生割合は男8.5%、女10.4%で、各年を通じて女の割合が高くなっている。

平成26年の体重別出生割合は図6のとおりで、3.0kg以上3.5kg未満が全体の40.9%を占め、この前後の2.5kg以上3.0kg未満、3.5kg以上4.0kg未満を合わせると89.8%になる。

図6 体重別出生割合 平成26年（佐賀県）




表5 平均体重・低体重児の数と割合の年次推移

佐賀県


年次	平均体重		総 数			男			女		
	男	女	全出生数	2,500g	割合	全出生数	2,500g	割合	全出生数	2,500g	割合
				未満			未満			未満	
	kg	kg	a	b	b/a×100 %			%			%
昭和 45 年	3.19	3.10	13 187	908	6.9	6 920	454	6.6	6 267	454	7.2
50	3.21	3.15	13 085	739	5.6	6 805	384	5.6	6 280	355	5.7
55	3.21	3.14	12 466	680	5.5	6 455	323	5.0	6 011	357	5.9
60	3.18	3.11	11 705	715	6.1	6 032	349	5.8	5 673	366	6.5
平成 2	3.15	3.07	9 555	642	6.7	4 970	305	6.1	4 585	337	7.4
7	3.12	3.03	8 729	664	7.6	4 473	327	7.3	4 256	337	7.9
8	3.10	3.03	8 941	704	7.9	4 610	342	7.4	4 331	362	8.4
9	3.10	3.02	8 909	757	8.5	4 496	344	7.7	4 413	413	9.4
10	3.10	3.02	8 741	698	8.0	4 468	322	7.2	4 273	376	8.8
11	3.09	3.01	8 551	733	8.6	4 422	340	7.7	4 129	393	9.5
12	3.10	3.01	8 745	750	8.6	4 578	348	7.6	4 167	402	9.6
13	3.08	3.00	8 561	761	8.9	4 329	343	7.9	4 232	418	9.9
14	3.08	2.99	8 202	744	9.1	4 240	353	8.3	3 962	391	9.9
15	3.07	3.01	7 898	699	8.9	3 972	341	8.6	3 926	358	9.1
16	3.08	2.98	7 844	691	8.8	4 063	304	7.5	3 781	387	10.2
17	3.05	2.97	7 508	718	9.6	3 783	311	8.2	3 725	407	10.9
18	3.07	2.98	7 647	735	9.6	4 023	340	8.5	3 624	395	10.9
19	3.07	2.98	7 703	741	9.6	3 944	334	8.5	3 759	407	10.8
20	3.05	2.97	7 819	755	9.7	3 975	345	8.7	3 844	410	10.7
21	3.05	2.97	7 518	677	9.0	3 818	312	8.2	3 700	365	9.9
22	3.04	2.96	7 640	749	9.8	3 943	351	8.9	3 697	398	10.8
23	3.05	2.98	7 613	693	9.1	3 890	323	8.3	3 723	370	9.9
24	3.06	2.97	7 440	676	9.1	3 817	302	7.9	3 623	374	10.3
25	3.06	2.97	7 276	707	9.7	3 690	328	8.9	3 586	379	10.6
26	3.04	2.96	7 159	675	9.4	3 667	312	8.5	3 492	363	10.4

## 第2章 死 亡

### 1 死亡の動き

平成26年の本県死亡者数は9,732人で、54分に1人の割合で亡くなったことになり、前年より92人増加し、人口千対死亡率は11.7で前年の11.5を上回った。

本県の死亡率の年次推移は図1のとおりで、戦後は医薬の進歩、公衆衛生の発展によって、およそ10年間に死亡率が半減する低下傾向をみせた。しかし、昭和30年代に入ってから、年によっては前年をわずかに上回ることもあるが、おおむね横ばい状態となっていた。近年は、人口の高齢化の進展に伴い、死亡率がやや上昇してきている。



本県の死亡率を全国と比べると、各年次とも平均をかなり上回っているが、その主な原因は高齢人口の割合が高いことによる。

一般に、異なる地域の比較にあたっては、一定の基準人口（昭和60年モデル人口）にあてはめて調整した年齢調整死亡率でみるべきであるが、表1のとおり、基準人口に全国の人口を使用した本県の年齢調整死亡率は、いずれの年も粗死亡率を下回り、全国の死亡率に近い率になっている。

表1 粗死亡率・年齢調整死亡率の比較

年次	佐 賀 県		全 国 死亡率
	粗死亡率	年齢調整 死亡率	
昭和 35 年	8.5	7.7	7.6
40	8.3	7.3	7.1
45	8.5	7.1	6.9
50	8.0	6.4	6.3
55	8.0	6.3	6.2
60	7.6	6.2	6.3
平成 2 年	8.3	6.8	6.7
7	9.0	7.5	7.4
12	9.0	7.7	7.7
17	9.9	8.5	8.6
22	10.9	9.4	9.5
24	11.5	10.0	10.0
25	11.5	10.0	10.1
26	11.7	10.2	10.1

注) 基準人口は、各年日本人人口を使用した。



## 2 季節別にみた死亡

図2により死亡率の季節変動をみると、平成26年は1月～2月、12月の時期が高く、6月～8月が低くなっている。

死因と季節の関係についてみると表2のとおりで、特に心疾患や肺炎などは冬期の死亡率が高くなっている。

図2 死亡率の季節変動（佐賀県）




表2 主な死因別・月別死亡率（人口10万対）

平成26年 佐賀県

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	1171.1	1333.3	1336.5	1224.2	1174.2	1098.1	1032.2	1057.0	1064.1	1089.3	1091.0	1228.4	1336.1
悪性新生物	336.7	333.0	370.2	328.7	361.6	324.5	344.1	310.3	320.2	344.1	341.5	333.8	333.0
心疾患 (高血圧性除く)	166.9	216.8	192.9	206.9	184.5	168.6	137.6	140.3	138.9	118.6	143.1	181.5	174.3
肺炎	131.3	145.9	144.3	153.0	139.1	117.6	98.1	113.3	120.4	124.4	127.5	142.0	150.2
脳血管疾患	105.9	130.4	134.9	86.4	82.0	96.3	101.0	96.3	82.2	101.0	102.0	112.7	147.4
老衰	54.5	69.4	53.3	49.6	45.4	38.3	54.2	48.2	45.3	51.2	46.8	79.1	73.7
不慮の事故	37.1	49.6	43.9	46.8	35.1	32.6	30.7	29.8	28.3	32.2	29.8	38.1	48.2
腎不全	20.9	21.3	25.1	31.2	19.0	12.8	14.6	29.8	18.4	13.2	14.2	30.7	21.3
慢性閉塞性肺疾患	17.6	19.8	14.1	12.8	26.4	24.1	8.8	18.4	22.7	11.7	11.3	14.6	25.5
自殺	17.0	19.8	23.5	15.6	20.5	12.8	20.5	14.2	18.4	16.1	19.8	11.7	11.3
糖尿病	12.6	19.8	14.1	12.8	8.8	22.7	5.9	5.7	14.2	10.2	8.5	2.9	25.5
肝疾患	11.9	8.5	12.5	14.2	10.2	11.3	11.7	18.4	7.1	10.2	7.1	11.7	19.8
高血圧性疾患	9.7	7.1	9.4	11.3	5.9	15.6	5.9	12.8	11.3	5.9	5.7	14.6	11.3

注：各月の率は年率に換算したものである。 月別死亡率 =  $\frac{\text{月間の死因別死亡数} \times \frac{\text{年間の日数}}{\text{月間の日数}}}{\text{人口}} \times 100,000$

### 3 地域別にみた死亡

死亡率を市郡別にみたものが表3、図3である。

一般的に、異なる地域の比較にあたっては、一定の基準人口（昭和60年モデル人口）にあてはめて調整した年齢調整死亡率でみるが、これによると粗死亡率ほどには各地域間の高低は目立たない。

年齢調整死亡率を地域別に比較すると、市部では唐津市が10.8で最高、嬉野市が9.3で最低となっている。郡部では東松浦郡が11.0と最高で、藤津郡が9.1で最低となっている。

保健所別にみると唐津保健所が10.8で最高、鳥栖保健所が9.6で最低となっている。


表3 粗死亡率・年齢調整死亡率－保健所・市郡別（人口千対）

保 健 所 別		粗死亡率	年齢調整死亡率	保 健 所 別		粗死亡率	年齢調整死亡率
市	郡			市	郡		
佐 賀 県		11.7	10.2	唐 津 保 健 所		13.0	10.8
市 部		11.6	10.3	唐 津 市		13.0	10.8
郡 部		12.5	10.0	東 松 浦 郡		13.5	11.0
佐賀中部保健所		11.0	10.3	伊 万 里 保 健 所		12.8	10.2
佐 賀 市		10.8	10.3	伊 万 里 市		12.9	10.4
多 久 市		14.9	10.6	西 松 浦 郡		12.7	9.8
小 城 市		11.4	10.6	杵 藤 保 健 所		13.5	10.1
神 埼 市		11.7	9.9	武 雄 市		12.8	10.5
神 埼 郡		8.2	9.7	鹿 島 市		12.6	10.4
鳥 栖 保 健 所		9.4	9.6	嬉 野 市		13.1	9.3
鳥 栖 市		8.2	9.3	杵 島 郡		15.3	10.5
三 養 基 郡		11.1	9.8	藤 津 郡		13.8	9.1

平成26年

注：基準人口は推計人口（日本人）を使用した。

図3 市郡別粗死亡率・年齢調整死亡率 平成26年



#### 4 年齢階級別にみた死亡

死亡率を年齢階級別にみると図4、表4のとおりである。

出生後まもなくは環境に対する適応性が備わっていないため死亡率はやや高く、10～14歳で最も低くなる。その後59歳ごろまでは緩やかに上昇し、以後は急速に上昇していたが、近年この年齢が次第に高くなっている。

年齢と死因については表5のとおりで、1歳未満では周産期に発生した病態と出生時の先天奇形及び染色体異常が55.6%を占めている。

15～29歳では、自殺が死因の第1位となり、不慮の事故を含めた疾病以外の死因が大きな割合を占めている。

30歳台から80歳台まで1位である悪性新生物は、若年層からも重視される死因となっている。

90歳以上にあっては、心疾患が1位である。

図4 年齢階級別死亡率の年次比較 佐賀県




表4 年齢階級別死亡率（人口千対）の年次推移

年齢階級	佐賀県													全国 26年
	昭和35年	40年	45年	50年	55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	25年	26年	
総数	8.5	8.3	8.5	8.0	8.0	7.8	8.3	9.0	9.0	9.9	10.9	11.5	11.7	10.1
0～4歳	9.4	6.0	4.5	2.9	2.1	1.7	1.2	1.3	0.9	0.4	0.7	0.7	0.3	0.6
5～9	1.0	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
10～14	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
15～19	1.2	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2
20～24	2.4	1.6	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
25～29	2.6	2.0	1.3	1.0	0.8	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4
30～34	2.4	1.6	1.4	1.4	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
35～39	3.2	2.4	2.0	1.7	1.5	1.0	1.3	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7
40～44	3.8	3.5	2.8	2.9	2.1	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0
45～49	6.1	5.6	4.8	3.8	3.1	3.0	2.4	2.1	2.3	2.2	2.0	1.6	2.0	1.6
50～54	9.2	7.6	6.3	5.4	5.1	4.5	4.1	4.0	4.2	3.4	3.1	2.6	2.5	2.6
55～59	14.2	12.6	10.0	8.5	7.1	6.0	6.3	5.9	5.4	5.3	4.2	4.5	3.8	4.0
60～64	20.8	18.8	16.9	13.2	11.6	9.7	10.0	9.4	7.8	7.3	6.6	6.1	6.4	6.4
65～69	35.4	32.7	28.5	21.1	19.2	15.2	13.2	14.5	13.0	11.5	9.7	9.0	9.6	9.4
70～74	57.6	49.0	46.4	36.9	33.0	27.9	23.1	21.5	19.6	18.5	16.3	15.6	15.1	14.6
75～79	92.7	80.5	79.4	66.3	58.1	46.8	43.1	38.5	31.4	30.8	26.8	25.2	25.1	25.1
80～84	144.3	142.8	126.7	110.2	98.5	86.9	72.2	70.1	53.9	47.8	47.4	47.6	46.7	45.5
85～89	205.6	206.6	205.2	169.4	159.1	137.6	125.5	117.4	99.5	88.1	85.0	86.0	80.7	81.8
90～	365.0	263.6	276.5	277.4	266.6	250.5	235.8	205.1	173.6	167.6	176.0	169.0	172.8	171.4
(再掲)														
85～	232.0	217.2	220.7	193.0	182.8	164.3	155.3	143.6	124.4	118.7	118.2	116.9	115.8	114.0

表5 年齢階級別死因順位

平成26年

年齢階級	第1位			第2位			第3位			第4位			第5位		
	死因	実数	割合%	死因	実数	割合%	死因	実数	割合%	死因	実数	割合%	死因	実数	割合%
総数	悪性新生物	2798	28.8	心疾患	1387	14.3	肺炎	1091	11.2	脳血管疾患	880	9.0	老衰	453	4.7
0歳	周産期に発生した病態	3	33.3	先天奇形、変形及び染色体異常	2	22.2				その他のすべての疾患	1	11.1			
				不慮の事故	2	22.2				その他の外因	1	11.1			
1～4	不慮の事故	1	33.3												
5～9	悪性新生物	1	100.0												
10～14															
15～19	悪性新生物	4	33.3				不慮の事故	3	25.0						
	自殺	4	33.3												
20～24	不慮の事故	2	25.0				悪性新生物	1	12.5						
	自殺	2	25.0				糖尿病	1	12.5						
							心疾患	1	12.5						
25～29	自殺	8	53.3	不慮の事故	4	26.7									
30～34	悪性新生物	6	25.0	不慮の事故	5	20.8				心疾患	3	12.5			
				自殺	5	20.8									
35～39	悪性新生物	12	33.3	自殺	9	25.0	不慮の事故	3	8.3	脳血管疾患	2	5.6	心疾患	1	2.8
													大動脈瘤及び解離	1	2.8
													肺炎	1	2.8
													肝疾患	1	2.8
													腎不全	1	2.8
40～44	悪性新生物	22	40.7	自殺	15	27.8	脳血管疾患	7	13.0	肝疾患	3	5.6	心疾患	2	3.7
45～49	悪性新生物	42	42.9	自殺	13	13.3	心疾患	7	7.1	脳血管疾患	6	6.1	不慮の事故	5	5.1
50～54	悪性新生物	60	47.6	自殺	14	11.1	心疾患	11	8.7	脳血管疾患	7	5.6	肺炎	4	3.2
													肝疾患	4	3.2
													不慮の事故	4	3.2
55～59	悪性新生物	90	42.7	自殺	21	10.0	心疾患	18	8.5	脳血管疾患	16	7.6	不慮の事故	11	5.2
60～64	悪性新生物	217	51.9	心疾患	35	8.4	脳血管疾患	30	7.2	肺炎	21	5.0	不慮の事故	16	3.8
65～69	悪性新生物	276	50.0	心疾患	53	9.6	脳血管疾患	39	7.1	肺炎	27	4.9	不慮の事故	21	3.8
70～74	悪性新生物	334	46.5	心疾患	64	8.9	脳血管疾患	54	7.5	肺炎	37	5.1	不慮の事故	21	2.9
75～79	悪性新生物	417	39.8	心疾患	116	11.1	肺炎	92	8.8	脳血管疾患	69	6.6	不慮の事故	40	3.8
80～84	悪性新生物	511	29.9	心疾患	225	13.2	肺炎	224	13.1	脳血管疾患	153	9.0	不慮の事故	57	3.3
85～89	悪性新生物	469	23.2	心疾患	315	15.6	肺炎	251	12.4	脳血管疾患	222	11.0	老衰	76	3.8
90～	心疾患	536	20.1	肺炎	429	16.1	悪性新生物	336	12.6	老衰	325	12.2	脳血管疾患	275	10.3

注 (1) 0歳については乳児の死因分類、それ以外については選択死因分類を使用した。  
死因順位は死亡数の多いものからとし、死亡数が同数の場合は同一順位に死因名を列記した。  
(2) 割合については、各年齢階級別の死亡総数に対する割合である。

5 死因別にみた死亡

死因順位は、明治から昭和の戦前にかけて上位を占めていた結核、肺炎及び気管支炎、胃腸炎などの感染性疾患が、戦後は次第に後退し、代わって生活習慣病と不慮の事故が上位を占めるようになってきた。

昭和30年からは1位脳血管疾患、2位悪性新生物の順であったが、53年に1位悪性新生物、2位脳血管疾患と逆転した。昭和59年から平成6年までの11年間は1位悪性新生物、2位心疾患、3位脳血管疾患、4位肺炎及び気管支炎、5位不慮の事故及び有害作用の順であったが、平成7年に2位と3位が入れ替わって11年まで続いた。しかし、平成12年には再び入れ替わって、1位悪性新生物、2位心疾患、3位脳血管疾患、4位肺炎、5位不慮の事故の順となり18年まで続いた。平成19年以降も1位悪性新生物、2位心疾患の順位は変わらず、3位、4位の脳血管疾患と肺炎が入れ代ったが、平成22年以降3位肺炎、4位脳血管疾患が続き、平成24年以降、第5位は不慮の事故に代わり老衰となった。

表6 死因順位の年次推移（人口10万対）

佐賀県

年次	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死因	率	死因	率	死因	率	死因	率	死因	率
昭和 25年	結核	140.2	脳血管疾患	107.9	悪性新生物	91.8	老衰	77.2	心疾患	69.7
30	脳血管疾患	134.5	悪性新生物	98.5	老衰	74.5	心疾患	63.6	結核	61.0
35	脳血管疾患	166.6	悪性新生物	125.5	心疾患	71.3	老衰	67.8	肺炎及び 気管支炎	50.3
40	脳血管疾患	194.1	悪性新生物	140.3	心疾患	81.3	老衰	59.6	不慮の事故 及び有害作用	52.0
45	脳血管疾患	199.4	悪性新生物	149.9	心疾患	110.3	不慮の事故 及び有害作用	53.3	老衰	48.5
50	脳血管疾患	183.7	悪性新生物	163.5	心疾患	120.8	不慮の事故 及び有害作用	40.2	肺炎及び 気管支炎	36.7
55	悪性新生物	178.9	脳血管疾患	162.0	心疾患	141.0	肺炎及び 気管支炎	41.0	老衰	34.1
60	悪性新生物	192.2	心疾患	138.2	脳血管疾患	130.8	肺炎及び 気管支炎	57.1	不慮の事故 及び有害作用	30.1
平成 2	悪性新生物	227.3	心疾患	157.8	脳血管疾患	118.2	肺炎及び 気管支炎	73.7	不慮の事故 及び有害作用	38.1
7	悪性新生物	262.9	脳血管疾患	137.6	心疾患	127.5	肺炎	98.4	不慮の事故	39.3
12	悪性新生物	282.9	心疾患	125.8	脳血管疾患	119.7	肺炎	94.4	不慮の事故	39.7
17	悪性新生物	313.9	心疾患	145.1	脳血管疾患	115.8	肺炎	102.4	不慮の事故	40.3
22	悪性新生物	320.7	心疾患	162.0	肺炎	133.0	脳血管疾患	106.6	不慮の事故	38.8
23	悪性新生物	338.0	心疾患	167.6	肺炎	133.0	脳血管疾患	109.1	不慮の事故	40.8
24	悪性新生物	331.1	心疾患	176.5	肺炎	133.7	脳血管疾患	103.7	老衰	47.6
25	悪性新生物	329.9	心疾患	161.7	肺炎	137.6	脳血管疾患	105.3	老衰	51.7
26	悪性新生物	336.7	心疾患	166.9	肺炎	131.3	脳血管疾患	105.9	老衰	54.5

## 6 主な死因

平成26年の主な死因について、前年と比較してみると表7のとおりである。

主な死因の死亡数では、肺炎が減少し、悪性新生物、心疾患は増加している。また、順位は1位～7位及び10位は昨年同様であるが、前年8位の自殺が9位となり、昨年9位の慢性閉塞性肺疾患が8位となった。

表7 主な死因順位別死亡数・死亡率（人口10万対）

佐賀県

死 因 順 位 (26年)	死 因	死亡数		死亡率		死亡割合		全国（平成26年）		全国順位	
		平成 26年	平成 25年	平成 26年	平成 25年	平成 26年	平成 25年	死亡率	死亡割合	平成 26年	平成 25年
	全 死 因	9 732	9 640	1171.1	1153.1	100.0	100.0	1014.9	100.0	22	21
1	悪性新生物	2 798	2 758	336.7	329.9	28.8	28.6	293.5	28.9	12	14
2	心 疾 患	1 387	1 352	166.9	161.7	14.3	14.0	157.0	15.5	29	32
3	肺 炎	1 091	1 150	131.3	137.6	11.2	11.9	95.4	9.4	8	8
4	脳血管疾患	880	880	105.9	105.3	9.0	9.1	91.1	9.0	22	28
5	老 衰	453	432	54.5	51.7	4.7	4.5	60.1	5.9	37	33
6	不慮の事故	308	323	37.1	38.6	3.2	3.4	31.1	3.1	27	22
7	腎 不 全	174	188	20.9	22.5	1.8	2.0	19.8	1.9	28	22
8	慢性閉塞性肺疾患	146	148	17.6	17.7	1.5	1.5	12.9	1.3	9	8
9	自 殺	141	151	17.0	18.1	1.4	1.6	19.5	1.9	46	43
10	大動脈瘤及び解離	132	106	15.9	12.7	1.4	1.1	13.1	1.3	13	33
	そ の 他	2 222	2 152	267.4	244.7	22.8	22.3	221.6	21.8	...	...





図6 主な死因別死亡率年次推移 (佐賀県)





(1) 悪性新生物

悪性新生物は、昭和53年以降の1位は変わらない。図6にみられるように、死亡率がわずかに低下する年も散見されるものの、他の疾病と違って確実に上昇している。

年齢別では、主に30歳から89歳までの各年齢層において死亡順位の1位であり（表5参照）、総死亡に占める割合も、昭和53年には22.2%だったが平成26年は28.8%と増加している。

平成26年の死亡率は336.7で、全国の293.5との差は大きい。全国順位は12位と長年にわたり上位に位置している。


市郡別死亡率を表8、図7で見ると、最高は西松浦郡の413.6で、多久市389.3、唐津市374.5と続いている。最低は鳥栖市の230.1で、次いで神埼郡の288.3となっている。

表8 市郡別悪性新生物死亡率

平成26年 佐賀県

市郡別	死亡率 (人口10万対)
<b>佐賀県</b>	<b>336.7</b>
西松浦郡	413.6
多久市	389.3
唐津市	374.5
三養基郡	373.8
鹿島市	368.8
嬉野市	366.9
伊万里市	353.2
東松浦郡	349.9
杵島郡	347.1
小城市	346.9
武雄市	346.7
神埼市	332.8
藤津郡	328.6
佐賀市	319.0
神埼郡	288.3
鳥栖市	230.1

図7 市郡別悪性新生物死亡率（平成26年）





悪性新生物の部位別死亡は表9、図8のとおりである。

男女別にみると、男の1位は「気管、気管支及び肺」、2位は「胃」、3位は「肝及び肝内胆管」であり、女の1位は「気管、気管支及び肺」、2位は「胃」で3位は「結腸」となっている。

全国と比べると高率の部位が多いが、中でも「肝及び肝内胆管」は男1.6倍、女1.4倍と高い死亡率で、昭和55年以降は全国1位または2位で推移している。

表9 悪性新生物の部位別死亡数・率・割合

平成26年

	死亡数	死亡率(人口10万対)									死亡割合(%)				全国 順位 (総数)
		佐賀県			全 国			佐賀県		全 国					
		総数	男	女	総数	男	女	男	女	男	女				
総数	2798	1599	1199	336.7	407.9	273.1	293.5	357.8	232.5	100.0	100.0	100.0	100.0	12	
食道	64	54	10	7.7	13.8	2.3	9.2	15.8	3.0	3.4	0.8	4.4	1.3	38	
胃	367	229	138	44.2	58.4	31.4	38.2	51.6	25.5	14.3	11.5	14.4	11.0	16	
結腸	261	131	130	31.4	33.4	29.6	26.5	27.0	26.1	8.2	10.8	7.5	11.2	10	
直腸S状結腸移行部及び直腸	110	61	49	13.2	15.6	11.2	12.1	15.9	8.5	3.8	4.1	4.4	3.7	16	
肝及び肝内胆管	298	196	102	35.9	50.0	23.2	23.6	31.5	16.1	12.3	8.5	8.8	6.9	1	
胆のう及びその他の胆道	142	59	83	17.1	15.1	18.9	14.4	14.8	14.1	3.7	6.9	4.1	6.1	22	
膵	205	106	99	24.7	27.0	22.6	25.3	26.9	23.8	6.6	8.3	7.5	10.2	35	
気管、気管支及び肺	516	377	139	62.1	96.2	31.7	58.5	86.0	32.4	23.6	11.6	24.0	14.0	23	
乳房	111	1	110	13.4	0.3	25.1	10.6	0.1	20.6	0.1	9.2	0.0	8.8	2	
子宮	61	・	61	13.9	・	13.9	10.0	・	10.0	・	5.1	・	4.3	1	
前立腺	96	96	・	24.5	24.5	・	18.9	18.9	・	6.0	・	5.3	・	12	
白血病	63	35	28	7.6	8.9	6.4	6.5	8.0	5.1	2.2	2.3	2.2	2.2	13	
その他	504	254	250	60.6	64.8	56.9	54.1	61.3	47.3	15.9	20.9	17.1	20.4	...	
(再掲)大腸	371	192	179	44.6	49.0	40.8	38.7	42.9	34.6	12.0	14.9	12.0	14.9	12	

- 注：1) 「大腸」は「結腸」と「直腸S状結腸移行部及び直腸」を示す。  
 2) 「乳房」及び「子宮」の全国順位は、女の順位である。  
 3) 「前立腺」の全国順位は、男の順位である。

図8 悪性新生物の部位別死亡割合 (平成26年) 佐賀県




表10 部位別にみた悪性新生物死亡数・死亡率の年次推移

佐賀県

年次	総 数	食 道	胃	結 腸	直 腸 S 状 結 腸	移 行 部 及 び 直 腸	肝 及 び 肝 内 胆 管	胆 の う 及 び	そ の 他 の 胆 道	膵	気 管 ・ 気 管 支	及 び 肺	乳 房	子 宮	前 立 腺	白 血 病	そ の 他	(再掲) 大 腸
昭和 35 年	1 183	33	524	27	43	152	…	23	58	15	85	…	31	192	70			
40	1 223	19	521	30	36	165	…	38	66	24	75	…	27	222	66			
45	1 255	42	526	36	45	134	…	53	103	25	59	…	45	187	81			
50	1 367	33	529	45	63	147	…	49	135	14	68	…	30	254	108			
55	1 546	34	474	73	49	190	…	76	217	30	63	…	31	309	122			
60	1 712	34	425	102	73	273	…	85	258	30	35	…	48	349	175			
平成 2	1 992	35	391	147	77	325	…	127	315	50	46	…	66	413	224			
7	2 320	63	404	197	82	374	135	135	373	43	51	51	73	390	279			
12	2 473	64	385	175	87	387	143	152	423	64	42	75	78	473	262			
17	2 709	73	400	199	88	405	147	203	467	78	31	87	92	439	287			
22	2 714	73	391	219	92	348	116	190	510	96	55	98	79	447	311			
23	2 849	72	395	265	93	371	136	232	523	107	38	98	71	448	358			
24	2 781	67	345	266	97	331	151	216	499	96	35	113	79	486	363			
25	2 758	67	374	238	84	296	145	217	516	90	54	89	93	495	322			
26	2 798	64	367	261	110	298	142	205	516	111	61	96	63	504	371			
死 亡 率 (人口10万対)																		
昭和 35 年	125.5	3.5	55.6	2.9	4.6	16.1	…	2.4	6.2	1.6	17.2	…	3.3	20.4	7.4			
40	140.3	2.2	59.8	3.4	4.1	18.9	…	4.4	7.6	2.8	16.3	…	3.1	25.5	7.6			
45	149.9	5.0	62.8	4.3	5.4	16.0	…	6.3	12.3	3.0	13.3	…	5.4	22.3	9.7			
50	163.5	3.9	63.3	5.4	7.5	17.6	…	5.9	16.1	1.7	15.4	…	3.6	30.4	12.9			
55	178.9	3.9	54.9	8.4	5.7	22.0	…	8.8	25.1	3.5	13.9	…	3.6	35.8	14.1			
60	192.2	3.8	47.7	11.5	8.2	30.7	…	9.5	29.0	3.4	7.5	…	5.4	39.2	19.6			
平成 2	227.3	4.0	44.6	16.8	8.8	37.1	…	14.5	35.9	5.7	9.9	…	7.5	47.1	25.6			
7	262.9	7.1	45.8	22.3	9.3	42.4	15.3	15.3	42.3	4.9	11.0	12.2	8.3	44.2	31.6			
12	282.9	7.3	44.0	20.0	10.0	44.3	16.4	17.4	48.4	7.3	9.1	18.1	8.9	54.1	30.0			
17	313.9	8.5	46.3	23.1	10.2	46.9	17.0	23.5	54.1	9.0	6.8	21.4	10.7	50.9	33.3			
22	320.7	8.6	46.2	25.9	10.9	41.1	13.7	22.5	60.3	11.3	12.3	24.6	9.3	52.8	36.8			
23	338.0	8.5	46.9	31.4	11.0	44.0	16.1	27.5	62.0	12.7	8.5	24.7	8.4	53.1	42.5			
24	331.1	8.0	41.1	31.7	11.5	39.4	18.0	25.7	59.4	11.4	7.9	28.5	9.4	57.9	43.2			
25	329.9	8.0	44.7	28.5	10.0	35.4	17.3	26.0	61.7	10.8	12.2	22.6	11.1	59.2	38.5			
26	336.7	7.7	44.2	31.4	13.2	35.9	17.1	24.7	62.1	13.4	13.9	24.5	7.6	60.6	44.6			

- 注：1) 死因名・死因内容はICD-10による。  
2) 「子宮」は女子人口10万対の死亡率である。  
3) 「前立腺」は男子人口10万対の死亡率である。

図9 悪性新生物の主な部位別死亡率の年次推移（佐賀県）




表11 悪性新生物の主な部位別にみた死亡数・死亡率の年次推移

佐賀県

	胃		気管、気管支 及び肺		肝及び肝内胆管		大腸		乳房		子宮	
総数												
年次	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
昭和 35 年	524	55.6	58	6.2	152	16.1	70	7.4	15	1.6	85	17.2
40	521	59.8	66	7.6	165	18.9	66	7.6	24	2.8	75	16.3
45	526	62.8	103	12.3	134	16.0	81	9.7	25	3.0	59	13.3
50	529	63.3	135	16.1	147	17.6	108	12.9	14	1.7	68	15.4
55	474	54.9	217	25.1	190	22.0	122	14.1	30	3.5	63	13.9
60	425	47.7	258	29.0	273	30.7	175	19.6	30	3.4	35	7.5
平成 2	391	44.6	315	35.9	325	37.1	224	25.6	50	5.7	46	9.9
7	404	45.8	373	42.3	374	42.4	279	31.6	43	4.9	51	11.0
12	385	44.0	423	48.4	387	44.3	262	30.0	64	7.3	42	9.1
17	400	46.3	467	54.1	405	46.9	287	33.3	78	9.0	31	6.8
22	391	46.2	510	60.3	348	41.1	311	36.8	96	11.3	55	12.3
23	395	46.9	523	62.0	371	44.0	358	42.5	107	12.7	38	8.5
24	345	41.1	499	59.4	331	39.4	363	43.2	96	11.4	35	7.9
25	374	44.7	516	61.7	296	35.4	322	38.5	90	10.8	54	12.2
26	367	44.2	516	62.1	298	35.9	371	44.6	111	13.4	61	13.9
男												
年次	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
昭和 35 年	307	68.4	42	9.4	87	19.4	44	9.8	-	-	・	・
40	319	77.6	41	10.0	90	21.9	41	10.0	1	0.2	・	・
45	312	79.4	60	15.3	86	21.9	46	11.7	-	-	・	・
50	332	84.3	99	25.1	91	23.1	59	15.0	-	-	・	・
55	285	69.5	153	37.3	132	32.2	47	11.5	1	0.2	・	・
60	251	59.1	210	49.4	191	44.9	91	21.4	-	-	・	・
平成 2	244	59.0	244	59.0	215	51.9	107	25.9	-	-	・	・
7	237	56.7	262	62.7	272	65.1	150	35.9	-	-	・	・
12	249	60.2	311	75.2	258	62.4	143	34.6	-	-	・	・
17	251	61.7	335	82.3	242	59.4	145	35.6	-	-	・	・
22	251	62.9	368	92.3	200	50.2	155	38.9	-	-	・	・
23	241	60.7	376	94.7	231	58.2	191	48.1	-	-	・	・
24	213	53.8	379	95.7	201	50.8	191	48.2	2	0.5	・	・
25	238	60.4	362	91.9	195	49.5	153	38.8	2	0.5	・	・
26	229	58.4	377	96.2	196	50.0	192	49.0	1	0.3	・	・
女												
年次	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
昭和 35 年	217	43.9	16	3.2	65	13.2	26	5.3	15	3.0	85	17.2
40	202	43.8	25	5.4	75	16.3	25	5.4	23	5.0	75	16.3
45	214	48.2	43	9.7	48	10.8	35	7.9	25	5.6	59	13.3
50	197	44.5	36	8.1	56	12.7	49	11.1	14	3.2	68	15.4
55	189	41.6	64	14.1	58	12.8	75	16.5	29	6.4	63	13.9
60	174	37.4	48	10.3	82	17.6	84	18.0	30	6.4	35	7.5
平成 2	147	31.8	71	15.4	110	23.8	117	25.3	50	10.8	46	9.9
7	167	35.9	111	23.9	102	22.0	129	27.8	43	9.3	51	11.0
12	136	29.5	112	24.3	129	28.0	119	25.8	64	13.9	42	9.1
17	149	32.7	132	29.0	163	35.8	142	31.1	78	17.1	31	6.8
22	140	31.3	142	31.7	148	33.1	156	34.9	96	21.5	55	12.3
23	154	34.5	147	33.0	140	31.4	167	37.4	107	24.0	38	8.5
24	132	29.7	120	27.0	130	29.3	172	38.7	94	21.2	35	7.9
25	136	30.8	154	34.8	101	22.9	169	38.2	88	19.9	54	12.2
26	138	31.4	139	31.7	102	23.2	179	40.8	110	25.1	61	13.9

注「子宮」の死亡率は女子人口10万対の率である。

## (2) 心疾患

心疾患の死因順位は、昭和35年から58年までは第3位で、59年に脳血管疾患に代わって第2位となり、平成7年から第3位と順位を下げたが、12年からは再び第2位となり、以降継続してその順位を保っている。

総死亡に占める割合は、昭和35年は8.3%、50年は15.0%となり、この10年間は15%前後で推移しており、平成26年は14.3%となっている。

死亡率は、昭和35年で71.3、45年で110.3、48年で120.6と、多少の起伏を伴いながら上昇し、平成5年の164.7をピークに6年から8年にかけて大幅に減少したが、その後はまた上昇傾向にあり、平成24年には176.5と昭和35年以降で最も高い率となり、平成26年は166.9となった。全国は157.0で、全国順位は前年の32位から29位となった。


市郡別心疾患死亡率を表12、図10で見ると、最高は伊万里市の279.4、次いで杵島郡の235.6、最低は神埼郡の110.4、次いで鳥栖市の111.5となっている。

表12 市郡別心疾患死亡率

平成26年 佐賀県

市郡別	死亡率 (人口10万対)
<b>佐賀県</b>	<b>166.9</b>
伊万里市	279.4
杵島郡	235.6
嬉野市	214.3
藤津郡	208.1
武雄市	184.5
東松浦郡	183.3
唐津市	176.7
小城市	171.2
多久市	164.7
鹿島市	157.6
佐賀市	146.8
西松浦郡	144.5
三養基郡	139.9
神埼市	135.0
鳥栖市	111.5
神埼郡	110.4

図10 市郡別心疾患死亡率（平成26年）



### (3) 脳血管疾患

脳血管疾患は、昭和 28 年以降第 1 位であったが、53 年に悪性新生物に代わって第 2 位、59 年からは心疾患に代わり第 3 位となった。その後、平成 7 年から 11 年には再び第 2 位となったが、これは、平成 7 年 1 月からの ICD-10 の導入による原死因選択ルールの明確化等によるもので、死亡傾向が急激に変化したものとは考えにくい。

その後、平成 12 年から平成 21 年までは 19 年の第 4 位を除き第 3 位となり、平成 22 年以降継続して第 4 位となっている。

総死亡数に占める割合は、昭和 47 年が 24.5%とピークであったが、平成 26 年は平成 24 年と同率で 9.0%と過去最低となった。

死亡率は、戦後年々漸増してきたが、昭和 47 年の 202.8 以降減少し、平成 5 年の 104.9 が最低となった。その後増減を繰り返しながら推移し、平成 24 年は 103.7(全国順位で 31 位)で平成 5 年を抜き戦後最低となったが、平成 26 年には 105.9 (全国順位 22 位)とわずかに増加し、依然として全国の 91.1 を上回っている。


市郡別脳血管疾患死亡率を表 13、図 11 でみると、最高は藤津郡の 197.2、次いで杵島郡の 158.7 で、最低は神埼郡の 49.1、次いで三養基郡の 57.5 となった。

表 13 市郡別脳血管疾患死亡率

平成 26年 佐賀県

市郡別	死亡率 (人口10万対)
<b>佐賀県</b>	<b>105.9</b>
藤津郡	197.2
杵島郡	158.7
鹿島市	134.1
東松浦郡	133.3
伊万里市	128.0
多久市	124.8
武雄市	123.7
嬉野市	119.9
神埼市	119.3
西松浦郡	114.6
小城市	105.9
唐津市	102.6
佐賀市	97.4
鳥栖市	86.1
三養基郡	57.5
神埼郡	49.1

図 11 市郡別脳血管疾患死亡率 (平成 26 年)



(4) 不慮の事故

死因順序は、昭和 56 年以降第 5 位が続いていたが、平成 24 年に第 6 位となり、以降継続してその順位を保っている。

死亡率は、多少の上下はあるものの昭和 50 年代からほぼ横ばい状態にあり、平成 26 年は 37.1 で全国 27 位であった。

不慮の事故の中で最も多いのは不慮の窒息（死亡率 10.5）で、死亡者の 89.7%を 65 歳以上の高齢者で占めている。

次に多いのは交通事故で（死亡率 7.7）で、こちらも死亡者の 65.6%を 65 歳以上の高齢者で占めている。

なお、交通事故は昨年より増加しており、うち発生地別の路上交通事故の死亡率は 7.9 と、全国の 4.1 より高くなっている。

表14 路上交通事故死亡率（人口10万対）及び自動車保有台数の年次推移

年次	路上交通事故死亡率(注)		自動車保有台数(各年3月末)	
	佐賀県	全国	佐賀県	全国
昭和30年	4.0	6.7	7 699	1 311 781
35	12.9	14.4	16 990	2 775 189
40	22.7	16.5	40 831	6 984 864
45	27.0	20.9	126 891	16 528 521
50	15.9	12.8	218 267	27 870 475
55	10.5	10.1	311 222	37 333 250
60	11.1	10.5	384 837	46 009 247
平成2年	16.4	11.9	459 958	57 993 866
7	16.9	11.4	540 614	68 103 696
12	14.6	9.5	595 127	74 582 612
17	9.8	7.1	632 469	78 278 880
20	9.9	5.4	644 109	79 080 762
21	6.5	5.2	645 956	78 800 542
22	7.6	5.1	648 148	78 693 495
23	6.9	4.8	649 949	78 660 773
24	7.3	4.6	653 868	79 112 584
25	7.3	4.3	659 792	79 625 203
26	7.9	4.1	665 441	80 272 571

注：路上交通事故の発生地別による死亡率である。

ただし、平成2年以前は自動車事故の死亡率である。

## 第3章 乳児死亡

### 1 乳児死亡の動き


平成 26 年の乳児死亡数は 9 人で前年の 23 人を下回り、乳児死亡率（出生千対）は 1.3 となった。

生後 1 年未満の死亡を乳児死亡といい、通常、出生数千に対する乳児死亡率で観察する。死亡統計で特にこれを取り上げて観察の対象とするのは、乳児の死亡は妊娠中の母体の保護と出生後の乳児の適切な保育によって、比較的容易に改善が図られるものであり、これらの条件は母親と乳児を取り巻く生活環境に左右される。乳児死亡率は、このような理由と算出の容易さから、公衆衛生の指標としてしばしば使われている。

本県の乳児死亡の推移を図 1 でみると、戦後は医療の進歩や公衆衛生の向上などにより急速な低下傾向をたどり、近年は昭和 25 年当時と比べると 1/45 以下に激減している。

乳児死亡率を全国と比べると、戦後長期間にわたり上回って推移していたが、昭和 54 年以降は下回っている年も多くなっている。平成 25 年に全国順位 3 位と上昇したものの、平成 26 年は昭和 57、58 年、平成 5 年、17 年、21 年以来の全国最下位となった。

図 1 乳児死亡率の年次推移



### 2 生存期間と乳児死亡

平成 26 年の乳児死亡率を生存期間によって分けてみると表 1、図 2 のとおりである。

死亡 9 人のうち 4 週未満のいわゆる新生児死亡が 5 人で、全乳児死亡の 55.6% を占めているが、このうち 3 人が生後 1 週未満の早期新生児死亡であり、うち 3 人が 1 日（24 時間）未満となっている。




表1 生存期間別・年次別乳児死亡率(出生千対)

佐賀県

年次	総数	4週未満	(再掲)		4週～ 3ヶ月未満	3ヶ月～ 6ヶ月未満	6ヶ月～ 9ヶ月未満	9ヶ月～ 1年未満
			1週未満	1日未満				
昭和30年	37.9	20.7	11.3	2.6	7.9	5.1	2.4	1.9
35	35.1	18.0	10.9	2.1	7.0	5.0	3.1	2.0
40	21.0	12.9	9.3	1.9	2.8	2.3	1.7	1.3
45	15.2	9.1	6.6	2.4	2.2	1.4	1.3	1.2
50	10.6	7.8	6.5	2.1	0.8	0.9	0.7	0.5
55	6.8	3.9	2.7	0.8	1.3	0.8	0.4	0.6
60	6.0	4.4	3.6	1.4	0.4	0.4	0.3	0.5
平成2年	4.6	2.8	1.8	0.8	0.5	0.7	0.2	0.3
7	3.7	1.6	1.1	0.6	0.9	0.6	0.5	0.1
12	2.9	1.5	1.4	0.7	0.8	0.2	0.2	0.1
17	1.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3
21	1.5	0.9	0.8	0.7	0.0	0.4	0.0	0.1
22	2.4	1.0	0.9	0.5	0.3	0.4	0.1	0.5
23	1.6	0.7	0.7	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4
24	1.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.5	0.1
25	3.2	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.4	0.1
26	1.2	0.7	0.4	0.4	0.1	0.1	0.3	-
割合(26)	100.0	55.6	33.3	33.3	11.1	11.1	22.2	-

図2 生存期間別・年次別乳児死亡率 (佐賀県)




3 乳児死亡の原因

乳児死亡の原因は、先天的なものとは後天的なものに大きく分けられる。

平成26年について死因別割合をみると図3のとおりで、周産期に発生した病態が33.3%、先天的奇形、変形及び染色体異常が22.2%、不慮の事故が22.2%となっている。

図3 乳児死亡の原因別割合 平成26年(佐賀県)



# 第4章 死産

## 1 死産の動き

平成26年の死産数は162胎で前年の157胎より増加し、死産率（出産千対）は、22.1で前年の21.1を上回った。

自然死産率は10.1で全国の10.6を下回り、人工死産率も12.0で全国12.3を下回った。

死産率の年次推移を図1で見ると、自然死産は昭和41年をピークにその後は低下を続け、人工死産も昭和28年をピークに多少の起伏はあるものの低下傾向にある。なお、昭和33年からは自然死産率が高くなっていったが、昭和58年から再び人口死産率が高くなり、現在まで継続している。

図1 自然－人工別死産率の年次推移 佐賀県




表1 自然－人工別死産数と死産率の年次推移


佐賀県

年次	総数		自然死産		人工死産		全国死産率	
	実数	死産率	実数	死産率	実数	死産率	自然	人工
昭和25年	2 501	77.0	1 136	35.0	1 365	42.0	41.7	43.2
30	2 001	82.5	903	37.2	1 098	45.2	44.5	51.3
35	1 729	90.9	940	49.4	789	41.5	52.3	48.1
40	1 386	87.6	832	52.6	554	35.0	47.6	33.8
45	1 083	75.9	656	46.0	427	29.9	40.6	24.7
50	801	57.7	509	36.7	292	21.0	33.8	17.1
55	670	51.0	363	27.6	307	23.4	28.8	18.0
58	669	52.9	329	26.0	340	26.9	25.4	20.1
60	632	51.2	242	19.6	390	31.6	22.1	23.9
平成2年	494	49.2	171	17.0	323	32.1	18.3	23.9
7	368	40.5	144	15.8	224	24.6	14.9	17.2
12	371	40.7	141	15.5	230	25.2	13.2	18.1
17	249	32.1	93	12.0	156	20.1	12.3	16.7
18	228	29.0	87	11.0	141	17.9	11.9	15.6
19	223	28.1	103	13.0	120	15.1	11.7	14.5
20	199	24.8	81	10.1	118	14.7	11.3	13.9
21	180	23.4	71	9.2	109	14.2	11.1	13.5
22	233	29.6	103	13.1	130	16.5	11.2	13.0
23	189	24.2	83	10.6	106	13.6	11.1	12.8
24	176	23.1	81	10.6	95	12.5	10.8	12.6
25	157	21.1	65	8.7	92	12.4	10.4	12.5
26	162	22.1	74	10.1	88	12.0	10.6	12.3

図2 妊娠期間別死産の割合(自然-人工) 26年(佐賀県)

## 2 妊娠期間別の死産

妊娠期間別について図2でみると、自然死産では満12～15週が36.5%、満16～19週が23.0%、満20～23週が10.8%と、満12～23週までが全体の70.3%を占めている。



## 3 人工妊娠中絶

死産統計には、母体保護法による妊娠満12週から満21週までの人工妊娠中絶を含んでいる。同法による人工妊娠中絶の件数は、昭和25年の3,449件から年々増加し、昭和27年に人工妊娠中絶の理由として「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合」が認められてから急増した。しかし、昭和31年の13,721件をピークにその後は減少を続け、平成26年度には1,491件となっている。

妊娠週数別割合をみると表2のとおりで、母体の負担が比較的軽い満11週以内の妊娠初期に多く、長年全体の9割以上を占めている。

表2 人工妊娠中絶数と率及び妊娠週数別割合の年次推移  
佐賀県

年次	人工妊娠中絶数	人工妊娠中絶率		妊娠週数別割合 (%)			
		佐賀県	全国	満11週以内	満12～19週	満20週以後	不詳
昭和 25年	3 449	14.4	15.0	68.0	22.6	9.2	0.2
30	12 769	52.1	50.2	89.0	7.7	3.3	0.0
35	8 221	34.3	42.0	92.1	5.3	2.6	0.0
40	6 998	30.4	30.2	94.5	3.3	2.2	—
45	6 041	26.4	24.8	95.5	3.0	1.5	0.0
50	4 918	22.4	22.1	96.6	2.2	1.2	—
55	4 795	22.2	19.5	94.2	4.3	1.5	—
60	4 711	22.3	17.8	93.3	4.6	2.1	—
平成 2	4 981	23.9	14.5	94.0	4.8	1.3	—
7	3 966	19.8	11.1	95.3	4.0	0.7	—
12	3 552	18.5	11.7	94.9	4.5	0.6	—
15年度	3 215	17.1	11.2	94.8	4.4	0.8	—
17	2 824	15.3	10.3	95.8	3.4	0.8	—
20	2 339	13.4	8.8	97.3	2.5	0.2	—
21	2 126	12.2	8.2	97.1	2.5	0.3	—
22	1 846	11.0	7.9	96.6	2.9	0.5	—
23	1 785	10.7	7.5	95.6	3.8	0.6	—
24	1 662	10.1	7.4	95.3	3.6	1.1	—
25	1 614	9.8	7.0	96.3	3.0	0.7	—
26	1 491	9.3	6.9	95.5	3.6	0.9	—

注:率は15歳以上50歳未満の女子人口千対である。

資料:厚生労働省「母体保護統計」、平成14年から「衛生行政報告例」。

## 第5章 周産期死亡

周産期死亡とは、妊娠満22週以後の死産に生後1週未満の早期新生児死亡を加えたものをいい、これは、周産期の児の死亡には母体の健康状態に強く作用されるという共通性が認められるためである。つまり、周産期死亡率（出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対）が高くなるほど母体の保護が不十分であるといえる。

平成26年の妊娠満22週以後の死産数は23胎、死亡率は3.2で前年の2.9を上回った。

一方、早期新生児死亡数は3人、死亡率は0.4で前年の1.0を下回った。

また、早期新生児死亡率を図1、表1でみると、昭和37年の13.4をピークに年々低下し、57年には2.0となった。その後も多少の起伏はあるものの低下傾向にある。

なお、平成26年の周産期死亡率は3.6と前年の3.8を下回り、全国28位となった。

図1 周産期死亡率の年次推移 佐賀県




表1 周産期死亡数と率の年次推移

佐賀県

年次	周産期死亡		妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡		周産期死亡中妊娠満22週以後の死産のしめる割合(%)
	死亡数	死亡率	死産数	死産率	死亡数	死亡率	
昭和30年	862	38.7	611	27.4	251	11.3	70.9
35	737	42.6	549	31.7	188	10.9	74.5
37	657	43.3	454	30.0	203	13.4	69.1
40	527	36.5	393	27.2	134	9.3	74.6
45	296	22.4	209	15.8	87	6.6	70.6
50	240	18.3	155	11.8	85	6.5	64.6
55	266	20.9	232	18.3	34	2.7	87.2
57	242	19.5	218	17.6	24	2.0	90.1
60	212	17.9	170	14.3	42	3.6	80.2
平成2	118	12.2	101	10.5	17	1.8	85.6
7	58	6.6	48	5.5	10	1.1	82.8
12	50	5.7	38	4.3	12	1.4	76.0
17	27	3.6	22	2.9	5	0.7	81.5
20	28	3.6	24	3.1	4	0.5	85.7
21	24	3.2	18	2.4	6	0.8	75.0
22	35	4.6	28	3.7	7	0.9	80.0
23	34	4.4	29	3.8	5	0.7	85.3
24	18	2.4	14	1.9	4	0.5	77.8
25	28	3.8	21	2.9	7	1.0	75.0
26	26	3.6	23	3.2	3	0.4	88.5
全国(26)	3 750	3.7	3 039	3.0	711	0.7	81.0

注：53年以前は満28週以後の死産

次に平成26年の周産期死亡を原因別にみると表2のとおりで、母側病態では「母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児」が61.5%を占め、児側病態では「周産期に発生した病態」が76.9%を占めている。

表2 妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・原因別周産期死亡数と死亡割合（平成26年）

佐賀県

死 因 (母側病態・児側病態)	死 亡 数			構 成 割 合 (%)		
	総 数	妊娠満22週以後の死産	早 期新生児死亡	総 数	妊娠満22週以後の死産	早 期新生児死亡
総 数	26	23	3	100.0	100.0	100.0
母						
母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	16	15	1	61.5	65.2	33.3
現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	7	7	-	26.9	30.4	-
母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	2	2	-	7.7	8.7	-
胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	7	6	1	26.9	26.1	33.3
その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-
胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-
母体に原因なし	10	8	2	38.5	34.8	66.7
児						
感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
新生物	-	-	-	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-
精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
側						
尿路性器系の疾患	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	20	19	1	76.9	82.6	33.3
先天奇形、変形及び染色体異常	6	4	2	23.1	17.4	66.7
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-

## 第6章 婚姻と離婚

表1 婚姻数と率の年次推移

年次	婚姻数	婚姻率(人口千対)	
		佐賀県	全 国
昭和 22 年	12 133	13.2	12.0
25	8 451	8.9	8.6
30	7 134	7.3	8.0
35	7 400	7.8	9.3
40	6 230	7.1	9.7
45	6 118	7.3	10.0
50	6 086	7.3	8.5
55	5 511	6.4	6.7
60	5 012	5.6	6.1
平成 2	4 539	5.2	5.9
7	4 550	5.2	6.4
12	4 749	5.4	6.4
17	4 155	4.8	5.7
22	4 210	5.0	5.5
23	4 015	4.8	5.2
24	4 003	4.8	5.3
25	3 992	4.8	5.3
26	3 928	4.7	5.1


### 1 婚姻の動き

平成26年の本県の婚姻数は3,928件で前年の3,992件より更に減少し、婚姻率(人口千対)は4.7で前年の4.8を下回り、昭和22年以降では最低となった。

婚姻率の年次推移は、終戦直後の婚姻ブームのあと急速に低下し、昭和30年代の初めは上昇傾向にあったが、34年を境にしてゆるやかに低下を続けた。

40年代に入ると、戦後第2の婚姻ブームを反映して上昇を始めたが、47年をピークに低下し、平成17年の4.8まで一貫して低下してきたが、それ以降はほぼ横ばいで推移している。

図1 婚姻数及び婚姻率の年次推移



## 2 結婚生活に入った年齢

平成 26 年に結婚生活に入り、届け出た人の平均初婚年齢は夫 29.9 歳、妻 28.5 歳で、夫も妻も徐々に上昇を続け、夫は平成 24 年に初めて 30 歳台となったが、平成 26 年は 23 年以來の 20 歳台となった。

また、年齢別割合は夫妻ともに 25～29 歳が最も多く、夫 38.7%、妻 40.8%となっている。

表 2 平均初婚年齢および夫妻の年齢差の年次推移(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)

年次	佐 賀 県			全 国		
	夫	妻	年齢差	夫	妻	年齢差
昭和25年	25.7 歳	23.0 歳	2.7 歳	25.9 歳	23.0 歳	2.9 歳
30	26.3	23.6	2.7	26.6	23.8	2.8
35	27.0	24.4	2.6	27.2	24.4	2.8
40	27.3	24.8	2.5	27.2	24.5	2.7
45	26.7	24.1	2.6	26.9	24.2	2.7
50	26.6	24.5	2.1	27.0	24.7	2.3
55	27.4	25.1	2.3	27.8	25.2	2.6
60	27.9	25.5	2.4	28.2	25.5	2.7
平成 2	28.4	25.9	2.5	28.4	25.9	2.5
7	28.4	26.3	2.1	28.5	26.3	2.2
12	28.0	26.5	1.5	28.8	27.0	1.8
17	29.0	27.4	1.5	29.8	28.0	1.8
21	29.6	28.0	1.6	30.4	28.6	1.8
22	29.6	28.2	1.4	30.5	28.8	1.7
23	29.9	28.3	1.5	30.7	29.0	1.7
24	30.0	28.6	1.4	30.8	29.2	1.6
25	30.0	28.6	1.4	30.9	29.3	1.6
26	29.9	28.5	1.4	31.1	29.4	1.7

注：同居を始めたときの年齢による。

表 3 初婚夫妻の年齢階級別割合 (平成26年)

佐賀県

	初 婚 者 数				平成26年に結婚生活に入り届け出たもの(再掲)			
	実 数		割 合		実 数		割 合	
	夫	妻	夫	妻	夫	妻	夫	妻
総数	3,186	3,357	100.0	100.0	2,834	2,990	100.0	100.0
20歳未満	77	127	2.4	3.8	68	101	2.4	3.4
20～24	599	822	18.8	24.5	504	685	17.8	22.9
25～29	1,237	1,341	38.8	39.9	1,096	1,219	38.7	40.8
30～34	692	646	21.7	19.2	633	598	22.3	20.0
35～39	370	303	11.6	9.0	339	284	12.0	9.5
40～44	139	85	4.4	2.5	130	75	4.6	2.5
45～49	35	21	1.1	0.6	32	18	1.1	0.6
50歳以上	37	12	1.2	0.4	32	10	1.1	0.3
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-

注：同居を始めたときの年齢による。



### 3 離婚の動き

平成26年の本県の離婚数は1,324件で前年の1,436件より減少し、離婚率(人口千対)は1.59で前年の1.72を下回った。

離婚率の年次推移を図2でみると、昭和39年までは低下、その後は多少の起伏を伴いながらも上昇を続けていたが59年をピークに低下した。その後、平成2年以降上昇に転じたが、平成18年以降再び減少傾向となった。

同居期間別(表5)にみると、5年未満が463件(離婚件数の35.0%)で最も多く、次いで5～10年未満の266件(同20.1%)、20年以上の209件(同15.8%)となっている。

離婚件数を前年と比較すると、全体的に減少しているが、10年以上15年未満及び20年以上での減少が目立っている。

表4 離婚数と率の年次推移

年次	離婚数	離婚率(人口千対)	
		佐賀県	全国
昭和22年	1 031	1.12	1.02
25	943	1.00	1.01
30	805	0.83	0.84
35	665	0.71	0.74
40	641	0.74	0.79
45	658	0.79	0.93
50	751	0.90	1.07
55	859	0.99	1.22
60	1 106	1.24	1.39
平成2年	991	1.13	1.28
7	1 224	1.39	1.60
12	1 635	1.87	2.10
17	1 759	2.04	2.08
19	1 542	1.80	2.02
22	1 536	1.82	1.99
23	1 516	1.80	1.87
24	1 471	1.75	1.87
25	1 436	1.72	1.84
26	1 324	1.59	1.77

図2 離婚数及び離婚率の年次推移






図3 同居期間別離婚数の年次推移（佐賀県）




表5 同居期間別離婚数の年次推移

佐賀県

	昭和50年	55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	23年	24年	25年	平成26年		
												件数	割合 %	対前年増減率%
総数	751	859	1,106	991	1,224	1,635	1,759	1,536	1,516	1,471	1,436	1,324	100.0	△ 7.8
5年未満	361	341	373	365	433	592	614	497	479	457	474	463	35.0	△ 2.3
5～10	170	222	251	223	263	355	357	340	335	334	278	266	20.1	△ 4.3
10～15	94	134	208	144	174	194	226	215	220	198	225	191	14.4	△ 15.1
15～20	67	73	140	122	133	164	169	153	166	154	134	132	10.0	△ 1.5
20年以上	52	86	133	133	204	284	310	268	245	255	254	209	15.8	△ 17.7
不詳	7	3	1	4	17	46	83	63	71	73	71	63	4.8	△ 11.3

注：総数には同居期間不詳を含む。

付表

## 人口動態月別発生率

佐賀県

		年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
出生 人口千対	昭和	45年	15.8	17.8	16.4	15.7	15.8	15.1	14.3	16.5	15.2	15.1	14.0	14.0	15.9	
		50	15.6	16.9	17.5	16.0	16.3	15.0	15.4	15.9	15.3	15.8	14.3	14.2	15.2	
		55	14.4	14.2	15.6	14.1	15.1	14.0	14.2	15.7	14.9	14.8	13.3	13.1	14.1	
		60	13.3	13.6	13.0	12.6	12.7	13.6	13.0	14.7	13.4	14.0	13.0	12.8	13.3	
		平成	2年	10.9	10.3	11.0	10.6	10.7	11.6	11.3	11.5	11.1	11.2	10.9	10.0	10.8
		7	9.9	10.1	9.4	9.4	9.4	10.4	10.1	10.3	10.7	10.5	9.1	9.1	10.1	
	平成	12	10.0	10.3	9.9	10.7	9.9	9.9	9.6	9.6	9.9	10.7	10.5	9.4	10.1	
		17	8.7	8.9	8.8	9.1	8.5	8.4	9.3	9.1	8.0	9.2	8.3	8.2	8.6	
		22	9.0	9.2	8.8	8.6	8.5	9.3	8.9	8.9	9.0	9.5	9.4	9.4	8.8	
		23	9.0	9.2	9.4	8.4	8.9	8.9	9.8	9.1	9.1	9.7	9.0	8.4	8.6	
		24	8.9	9.1	r 8.4	9.3	8.7	9.0	8.8	8.5	8.8	r 9.3	r 9.2	8.9	8.3	
		25	8.7	8.9	8.2	8.4	8.8	8.2	8.4	9.3	8.7	9.6	8.8	8.2	9.1	
		26	8.6	9.3	8.2	8.1	8.5	8.5	8.3	8.9	9.0	9.1	8.1	8.4	8.9	
死亡 人口千対		昭和	45年	8.5	13.3	10.7	9.1	8.2	7.1	6.7	7.5	7.1	6.9	8.0	8.4	9.6
	50		8.0	9.0	8.3	8.5	8.5	7.9	6.5	8.1	7.4	7.0	7.9	8.1	9.3	
	55		8.0	9.2	10.7	8.3	7.9	7.2	6.9	6.6	6.9	6.9	7.8	8.2	8.9	
	60		7.7	8.9	8.7	8.1	7.6	6.9	6.9	6.4	6.9	6.9	7.4	8.1	10.2	
	平成		2年	8.3	9.8	9.1	8.9	8.2	7.7	7.2	7.4	8.0	8.1	7.8	8.6	8.7
	7		9.0	13.2	10.5	10.0	8.4	8.2	7.7	7.7	7.8	7.6	8.2	9.2	9.6	
	平成	12	9.0	11.4	11.4	9.8	9.7	8.2	7.9	7.8	7.8	7.5	8.1	9.2	9.7	
		17	9.9	11.3	11.3	11.6	9.6	9.3	8.5	8.6	9.1	9.1	8.9	10.4	11.2	
		22	10.9	12.5	11.4	11.0	11.0	11.2	9.9	9.4	9.8	10.1	10.4	11.9	12.0	
		23	11.2	13.7	13.2	12.0	11.3	10.2	11.2	9.6	10.1	10.0	10.7	10.8	12.3	
		24	11.5	r 13.4	12.8	11.5	r 11.1	r 10.8	9.7	10.8	10.7	r 11.4	11.0	12.2	12.9	
		25	11.5	14.3	12.7	12.3	11.4	11.0	9.5	10.2	10.6	10.8	11.6	11.0	12.8	
		26	11.7	13.3	13.4	12.2	11.7	11.0	10.3	10.6	10.6	10.9	10.9	12.3	13.4	
乳児 出生千対		昭和	45年	15.2	24.4	11.0	14.3	18.6	13.0	14.7	13.6	10.1	12.0	17.0	10.0	21.1
	50		10.6	8.6	6.6	13.7	5.3	14.7	9.8	13.1	10.6	11.0	9.8	10.2	9.9	
	55		6.9	9.6	4.1	4.6	5.7	7.4	4.8	10.2	6.5	7.7	9.4	5.8	4.7	
	60		6.0	4.9	6.6	7.9	6.2	8.9	5.1	7.0	7.6	3.1	4.0	5.2	5.0	
	平成		2年	4.6	5.0	1.4	3.7	1.3	3.7	5.1	4.9	3.7	1.3	7.4	10.2	7.4
	7		3.7	8.1	3.0	8.1	-	6.7	7.0	1.3	2.7	-	2.7	2.8	1.3	
	平成	12	2.9	4.1	1.4	1.4	7.0	5.4	1.4	1.4	1.4	4.2	1.4	1.4	4.1	
		17	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	-	3.2	1.6	3.1	-	1.6	1.6	3.1	
		22	2.4	1.5	3.4	1.5	1.6	4.6	1.6	1.5	4.6	-	3.1	4.8	-	
		23	1.6	1.5	1.7	1.5	3.2	1.5	3.2	-	-	-	3.1	-	3.1	
		24	1.6	3.2	-	1.6	-	3.2	1.6	1.6	3.2	-	1.6	1.6	1.6	
		25	3.2	r 4.9	-	-	3.3	r 8.1	r 3.3	r 3.2	-	r 1.7	3.2	r 1.7	r 3.2	
		26	1.3	-	-	1.6	1.7	1.6	-	1.6	-	8.5	-	-	-	
死産 出生千対		昭和	45年	75.9	71.2	90.7	77.5	85.1	82.6	79.4	75.5	70.1	78.5	67.0	75.9	57.3
	50		57.7	52.2	58.6	60.2	64.3	62.3	38.9	67.1	67.1	61.3	56.6	54.2	48.5	
	55		51.0	68.3	54.1	54.9	47.1	56.3	46.3	59.4	48.7	55.8	47.4	40.2	46.1	
	60		51.2	47.9	57.1	53.3	63.1	72.8	47.6	44.5	44.9	38.1	51.0	46.2	47.1	
	平成		2年	49.2	56.5	57.3	48.3	44.8	45.4	38.0	45.8	52.9	60.7	51.6	48.8	40.5
	7		40.5	29.8	44.4	59.5	33.4	41.4	33.4	44.0	42.7	25.4	41.4	49.5	40.1	
	平成	12	40.7	32.4	36.0	51.8	36.1	44.0	54.9	37.6	35.0	40.1	36.3	41.5	42.7	
		17	32.1	31.3	38.1	37.4	38.1	20.6	19.3	33.4	31.4	35.3	27.3	36.3	36.8	
		22	29.6	20.7	35.4	44.7	31.2	29.1	34.5	34.6	24.1	25.0	32.8	16.6	27.8	
		23	24.2	20.7	34.9	40.0	26.9	15.4	24.5	24.0	18.1	21.8	22.8	18.6	23.8	
		24	23.1	15.2	29.7	27.8	16.4	22.9	19.4	16.2	33.8	33.3	19.6	16.1	26.4	
		25	21.1	23.2	18.7	21.4	19.4	22.0	30.4	22.3	25.3	15.0	21.8	14.0	19.8	
		26	22.1	16.5	22.4	33.6	15.3	24.4	20.8	21.7	23.2	31.3	30.4	12.0	14.2	
婚姻 人口千対		昭和	45年	7.3	5.6	7.4	10.1	11.6	9.9	7.2	3.9	3.2	3.4	8.7	7.9	8.6
	50		7.3	5.6	7.7	10.2	11.6	11.4	5.9	3.6	2.1	3.0	9.2	9.0	8.0	
	55		6.4	4.9	6.8	8.6	9.1	10.2	5.4	2.6	1.8	3.4	7.4	8.3	8.0	
	60		5.6	3.3	5.4	8.1	8.1	9.0	4.9	3.0	1.8	4.2	7.2	7.5	6.0	
	平成		2年	5.2	3.1	4.7	7.0	6.9	7.4	6.0	3.2	1.9	3.1	6.6	6.7	5.4
	7		5.2	3.6	4.1	6.6	5.6	6.9	5.9	4.4	2.6	4.0	6.0	6.8	5.3	
	平成	12	5.4	5.3	5.5	6.7	5.4	5.9	5.5	4.9	3.2	5.1	5.5	6.3	6.2	
		17	4.8	3.7	4.6	6.2	5.0	5.4	4.0	4.3	3.6	4.4	5.2	6.2	5.1	
		22	5.0	4.2	6.1	5.4	5.0	5.0	4.2	4.6	4.1	4.5	5.7	5.8	5.3	
		23	4.8	4.3	5.0	6.3	5.1	4.9	4.2	4.4	3.9	4.2	4.3	6.2	4.4	
		24	4.8	4.0	5.6	6.3	4.5	5.0	4.1	4.3	4.3	r 4.1	4.5	r 5.5	r 5.1	
		25	4.8	3.4	5.2	6.1	4.8	4.5	3.8	4.8	4.0	4.6	4.4	6.7	5.0	
		26	4.7	4.1	5.8	6.1	5.3	4.5	3.8	4.5	4.0	3.7	4.3	6.4	4.4	
離婚 人口千対		昭和	45年	0.79	0.62	0.74	0.78	0.96	0.66	0.84	0.77	0.80	0.88	0.91	0.70	0.77
	50		0.90	0.93	1.01	0.89	1.00	0.94	0.89	0.93	0.82	0.95	0.86	0.79	0.83	
	55		0.99	0.81	0.98	0.93	1.31	1.07	0.82	1.04	0.90	1.14	1.23	0.88	1.13	
	60		1.24	0.94	1.38	1.33	1.12	1.21	1.09	1.35	1.34	1.20	1.39	1.19	1.37	
	平成		2年	1.13	0.98	1.04	1.69	1.18	1.25	1.19	1.28	0.93	0.99	0.99	0.96	1.07
	7		1.39	1.49	1.46	1.55	1.38	1.48	1.27	1.48	1.23	1.28	1.37	1.38	1.27	
	平成	12	1.87	1.36	2.12	1.86	2.07	2.13	1.79	2.00	1.69	1.90	1.92	1.62	2.00	
		17	2.04	2.05	1.83	2.10	2.10	1.94	2.10	1.92	2.21	2.02	1.95	2.03	2.20	
		22	1.82	1.82	2.26	2.25	1.98	1.47	1.78	1.57	1.91	1.94	1.61	1.68	1.53	
		23	1.80	1.73	1.93	2.25	1.66	1.75	1.63	1.72	1.91	1.98	1.76	1.53	1.73	
		24	1.75	1.88	r 1.82	r 2.15	r 1.99	1.63	1.80	r 1.52	r 1.90	1.39	r 1.79	r 1.70	r 1.45	
		25	1.72	1.52	1.89	1.99	1.59	1.75	1.75	1.55	1.61	1.72	1.94	1.46	1.87	
		26	1.59	1.69	1.68	1.97	1.51	1.37	1.52	1.59	1.32	1.83	1.53	1.46	1.66	